

## COMITETUL DE REDACȚIE

Redactor responsabil:

ACADEMICIAN EM. POP

Redactor responsabil adjunct:

ACADEMICIAN N. SĂLĂGEANU

Membri:

ACADEMICIAN ȘT. PÉTERFI

I. POPESCU-ZELETIN, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România;

prof. dr. I. T. TARNAVSCHI; prof. TR. I. ȘTEFUREAC;

dr. VERA BONTEA; dr. ALEXANDRU IONESCU;

GEORGETA FABIAN — secretar de redacție.

Prețul unui abonament este de 90 de lei.

În țară, abonamentele se primesc la oficiile poștale, agențiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții. Comenzile de abonamente din străinătate se primesc la I.C.E. LIBRI, Căsuța poștală 134—135 (Calea Victoriei 126), București, România sau la reprezentanții săi din străinătate.

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice corespondență se vor trimite pe adresa Comitetului de redacție al revistei „Studii și cercetări de biologie — Seria botanică”.

APARE DE 6 ORI PE AN

ADRESA REDACTIEI:  
SPLAIUL INDEPENDENTEI Nr. 200  
BUCUREȘTI

BIOL. INV. 93

# Studii și cercetări de BIOLOGIE

## SERIA BOTANICĂ

TOMUL 23

1971

Nr. 4

## S U M A R

|   | Pag. |
|---|------|
| VERA BONTEA și AL. MANOLIU, Contribuții la cunoașterea micromicetelor din Masivul Ceahlău (Nota III) . . . . .  | 295  |
| EUGENIA ELIADE, Două specii de <i>Peronospora</i> Corda noi pentru România . . . . .  | 301  |
| M. TOMA, Ascomicete din România (I) . . . . .   | 305  |
| GH. DIHORU, Taxonomia speciilor de <i>Setaria</i> din România . . . . .   | 309  |
| 37 GH. MIHAI, <i>Coseinodon cribrosus</i> (Hedw.) Spruce în brioflora Moldovei și răspândirea ei în România . . . . .   | 319  |
| A. POPESCU, Răspândirea speciilor <i>Bartschia alpina</i> L. și <i>Gentiana frigida</i> Haenke în Carpații românești . . . . .  | 325  |
| V. SANDA și A. POPESCU, Răspândirea speciilor <i>Primula farinosa</i> L., <i>P. halleri</i> J. F. Gmel., <i>P. auricula</i> L. și <i>P. intricata</i> Gren. et Godr. în flora României. . . . . | 331  |
| GH. GOLDEA, Cercetări fitocenologice asupra pădurilor din Munții Plopiș (II) . . . . .  | 337  |
| V. ZANOSCHI, Contribuție la cunoașterea vegetației Masivului Ceahlău . . . . .  | 347  |
| VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ . . . . .   | 359  |
| RECENZII . . . . .  | 361  |

St. și cerc. biol. Seria botanică t. 23 nr. 4 p. 293—364 București 1971

## CONTRIBUȚII LA CUNOAȘTEREA MICROMICETELOR DIN MASIVUL CEHLĂU (NOTA III)

DE

VERA BONTEA și AL. MANOLIU

582.28 (498)

Die beiden ersten Beiträge bezüglich der Mikromyceten aus dem Ceahlăugebirge wurden in den Zeitschriften „Ocotirea Naturii“ (4) und „Studii și Cercetări de Biologie“ (2) veröffentlicht.

In der vorliegenden Arbeit bringen wir 64 Mikromyceten die den *Basidiomyceten* und *Deuteromyceten* angehören. Davon sind 9 Arten auf 12 für Rumänien neuen Wirtspflanzen angeführt und zwar: *Puccinia striiformis* West. auf *Holcus lanatus* L., *Ascochyta graminicola* Sacc. auf *Holcus lanatus* L., *A. lathyri* Trail auf *Lathyrus pratensis* L., *Septoria inconspicua* B. et C. auf *Pimpinella major* (L.) Huds., *Ramularia lactea* (Desm.) Sacc. auf *Viola silvatica* Fr., *Cladosporium herbarum* (Pers.) Link auf *Campanula trachelium* L., *Trifolium alpestre* L., *T. pannonicum* L., *Corylus avellana* L., *Cladosporium typharum* Desm. auf *Typha shuttleworthii* Koch et Sonder, *Isariopsis geranii* Săvul. et Sandu auf *Geranium palustre* Torn. und *Tubercularia vulgaris* Tode auf *Ribes grossularia* L.

În lucrarea de față prezentăm un număr de 64 de specii de micromicete aparținând claselor *Basidiomycetes* și *Deuteromycetes*. Dintre acestea, 9 specii de micromicete sînt citate pe 12 specii de plante-gazdă noi pentru țara noastră, și anume: *Puccinia striiformis* West. pe *Holcus lanatus* L., *Ascochyta graminicola* Sacc. pe *Holcus lanatus* L., *A. lathyri* Trail pe *Lathyrus pratensis* L., *Septoria inconspicua* B. et C. pe *Pimpinella major* (L.) Huds., *Ramularia lactea* (Desm.) Sacc. pe *Viola silvatica* Fr., *Cladosporium herbarum* (Pers.) Link pe *Campanula trachelium* L., *Trifolium alpestre* L., *T. pannonicum* L., *Corylus avellana* L., *Cladosporium typharum* Desm. pe *Typha shuttleworthii* Koch et Sonder, *Isariopsis geranii* Săvul. et Sandu pe *Geranium palustre* Torn. și *Tubercularia vulgaris* Tode pe *Ribes grossularia* L.

## BASIDIOMYCETES

1. *Ustilago crameri* Körn. în ovare de *Setaria glauca* (L.) P. Beauv., Durău, 30.VIII.1969. Teleutospori 9—11 × 7—8,5 μ (fig. 1).
2. *Calypsotheca goeppertiana* Kühn pe frunze de *Abies alba* Mill., Durău, 4.VII.1969. Ecidiospori 24,5—32 × 21—25 μ.
3. *Melampsoridium betulinum* (Pers.) Kleb. pe frunze de *Betula pendula* Roth, Izvorul Muntelui, 3.IX.1969. Uredospori 24—37 × 9—12 μ.
4. *Coleosporium campanulae* (Pers.) Lévl. pe frunze de *Campanula rapunculoides* L., Izvorul Muntelui, 5.IX.1969. Teleutospori 58—66 × 26—34 μ (fig. 2). *C. trachelium* L., Durău, 5.VII.1968, 3.VIII.1969. Uredospori 18—24 × 13—17 μ. Teleutospori 56—64 × 28—32 μ.
5. *C. petasites* (DC.) Lévl. pe frunze de *Petasites hybridus* (L.) G. M. Sch., Durău, 2.VII.1968. Teleutospori 72—93 × 20—24 μ.
6. *C. senecionis* (Pers.) Fr. f. sp. *senecionis-nemorensis* Wagn. pe frunze de *Senecio fuchsii* Gmel., Durău, 27.VIII.1969. Teleutospori 82—94 × 17—24 μ (fig. 3).
7. *Melampsora allii-salicis-albae* Kleb. pe frunze de *Salix alba* L., Izvorul Muntelui, 13.VII.1968. Uredospori 17—38 × 11—14 μ. Teleutospori 22—40 × 10—13 μ.
8. *M. amygdalina* Kleb. pe frunze de *Salix triandra* L., Durău, 4.VII.1968. Uredospori 24—35 × 10—16 μ.
9. *M. evonymi-capraearum* Kleb. pe frunze de *Salix capraea* L., Izvorul Muntelui, 13.VII.1968. Uredospori 20—24 × 13—16 μ.
10. *M. hypericorum* (DC.) Wint. pe frunze de *Hypericum maculatum* Cr., Durău, 2.VII.1968. Ecidiospori 14—20 × 10—16 μ.
11. *M. larici-capraearum* Kleb. pe frunze de *Salix capraea* L., Durău, 10.VII.1968, 30.VIII.1969. Uredospori 15—29 × 14—22 μ.
12. *Phragmidium mucronatum* (Pers.) Schlecht. pe frunze de *Rosa canina* L., Durău, 4.VII.1968, 11.VII.1969. Uredospori 25—29 × 17—24 μ. Teleutospori 80—100 × 26—36 μ.
13. *Ph. potentillae* (Pers.) Karst. pe frunze de *Potentilla aurea* Torn., Durău, 4.VII.1968. Uredospori 21—30 × 17,5—20 μ. Teleutospori 55—80 × 18—27 μ.
14. *Ph. rubi-idaei* (Pers.) Karst. pe frunze de *Rubus* sp., Durău, 31.VIII.1969. Teleutospori 75—126 × 28—33 μ.
15. *Ph. rubi* (Pers.) Wint. pe frunze de *Rubus caesius* L., Durău, 11.VII.1969. Uredospori 17—21 × 16—19 μ. Teleutospori 58—74 × 25—28 μ (fig. 4).
16. *Uromyces acetosae* Schröt. pe frunze de *Rumex acetosa* L., cabana „7 Noiembrie”, 6.VII.1968. Ecidiospori 21—24 × 13—19 μ. Uredospori 20—26 × 21—23 μ.
17. *U. anthyllidis* (Grev.) Schröt. pe frunze de *Anthyllis vulneraria* L., Durău, 5.VII.1968. Uredospori 21—26,5 × 17—22 μ.
18. *U. fabae* (Pers.) De Bary f. sp. *viciae-sepium* Gäum. pe frunze de *Vicia sepium* L., Durău, 30.VIII.1969. Teleutospori 27—39 × 21—25 μ; f. sp. *viciae-fabae* De Bary pe frunze de *Vicia faba* L., Durău, 4.VII.1968. Uredospori 32—36 × 24—30 μ.

19. *U. geranii* (DC.) Fr. pe frunze de *Geranium* sp., Izvorul Muntelui, 13.VII.1968. Uredospori 24—27 × 18—22 μ. Teleutospori 26—32 × 17—23 μ (fig. 5).
20. *U. pisi* (Pers.) De Bary pe frunze de *Lathyrus pratensis* L., Durău, 4.VII.1968. Uredospori 23—27 × 20—22 μ.
21. *U. rumicis* (Schum.) Wint. pe frunze de *Rumex obtusifolius* L., cabana „7 Noiembrie”, 1.IX.1969. Uredospori 26—30 × 18—23 μ. Teleutospori 32—36 × 21—24 μ (fig. 6).
22. *U. striatus* Schröt. pe frunze de *Medicago* sp., Durău, 31.VIII.1969. Teleutospori 20—22 × 15—17,5 μ. *Trifolium medium* L., Durău, 3.VII.1969. Teleutospori 26—33 × 20—23 μ.
23. *U. trifolii* (Hedw. f.) Lévl. pe frunze de *Trifolium alpestre* L., Durău, 5.VII.1968. Uredospori 24—28 × 14—19 μ. Teleutospori 20—30 × 16—21 μ. *T. montanum* L., Durău, 27.VIII.1969. Uredospori 19—24 × 14—18 μ. Teleutospori 21—27 × 14—21 μ.
24. *Puccinia absinthii* (Hedw. f.) DC. pe frunze de *Artemisia absinthium* L., Durău, 5.VII.1968, 30.VIII.1969. Uredospori 24—28 × 18—21 μ.
25. *P. arenariae* (Schum.) Wint. pe frunze de *Stellaria nemorum* L., cabana „7 Noiembrie”, 1.IX.1969. Teleutospori 36—48 × 17—20 μ.
26. *P. bardanae* Oda pe frunze de *Arctium lappa* L., Izvorul Muntelui, 13.VII.1968. Uredospori 28—33 × 21—24 μ. Teleutospori 32—39 × 24—27 μ.
27. *P. betonicae* (Alb. et Schw.) DC. pe frunze de *Betonica officinalis* L., Durău, 10.VII.1969. Teleutospori 24—38 × 21—24 μ (fig. 7).
28. *P. calthae* (Grev.) Link pe frunze de *Caltha laeta* (Sch., Nym., Ky) Hegi, Durău, 4.VII.1968, 11.VII.1969. Uredospori 22—33 × 16—21 μ.
29. *P. carduorum* Jacky pe frunze de *Carduus acanthoides* L., Durău, 5.VII.1968, 30.VIII.1969. Uredospori 28—32 × 22—27 μ. Teleutospori 31—45 × 17,5—21 μ. *C. crispus* L., Durău, 30.VIII.1969. *Carduus* sp., Durău, 5.VII.1968.
30. *P. doronicella* Syd. pe frunze de *Doronicum columnae* Ten., Durău, 30.VIII.1969. Uredospori 26—31 × 20—23 μ.
31. *P. ferruginosa* Syd. pe frunze de *Artemisia vulgaris* L., Izvorul Muntelui, 13.VII.1968. Teleutospori 36—59 × 17—21 μ (fig. 8).
32. *P. galii-silvatici* Otth pe frunze de *Galium schultesii* Vest., Durău, 28.VIII.1969. Uredospori 23—26,5 × 18—21 μ. Teleutospori 30—42 × 15—22 μ.
33. *P. graminis* Pers. f. sp. *avenae* Erickss. et Henn. pe frunze de *Briza media* L., Durău, 5.VII.1968. Uredospori 26—34 × 14—18 μ.
34. *P. malvacearum* Mont. pe frunze de *Malva neglecta* Wallr., Izvorul Muntelui, 13.VII.1968. Teleutospori 42—64 × 14—25 μ.
35. *P. menthae* Pers. f. sp. *calaminthae* Cruchet pe frunze de *Calamintha vulgaris* (L.) Druce, Durău, 30.VIII.1969. Uredospori 21—25 × 17,5—21 μ. Teleutospori 28—35 × 18—24 μ. Parazitată de *Darlucă filum* (Biv.) Cast. (fig. 9).
36. *P. nigrescens* Kirchn. pe frunze de *Salvia verticillata* L., Durău, 3.VII.1968, 31.VIII.1969. Uredospori 24—27 × 21—23 μ. Teleutospori 35—45 × 25—28 μ (fig. 10).

37. *P. pimpinellae* (Str.) Mart. pe frunze de *Pimpinella saxifraga* L., Durău, 4.VII.1968, 30.VIII.1969. Uredospori  $22-33 \times 19-25 \mu$ . Teleutospori  $26-42 \times 19-27 \mu$  (fig. 11).

38. *P. poarum* Niels. pe frunze de *Tussilago farfara* L., Izvorul Muntelui, 14.VII.1968, Durău, 30.VIII.1969. Ecidiospori  $17-22 \times 16-19 \mu$  (fig. 12).

39. *P. prenanthis-purpureae* (DC.) Lindr. pe frunze de *Mycelis muralis* (L.) Dum., Durău, 31.VIII.1969. Uredospori  $21-24 \times 17-21 \mu$ . Teleutospori  $31-35 \times 21-24 \mu$  (fig. 13).

40. *P. pseudosphaeria* Mont. pe frunze de *Sonchus arvensis* L., Izvorul Muntelui, 14.VII.1968. Uredospori  $25-32 \times 20-24 \mu$ . Teleutospori  $26-40 \times 20-27 \mu$ .

41. *P. puctata* Link f. sp. *galii-silvatici* Otth pe frunze de *Galium silvaticum* L., Durău, 4.VII.1968. Uredospori  $26-33 \times 21-27 \mu$ .

42. *P. striiformis* West. pe frunze de *Holcus lanatus* L., Durău, 2.VII.1968. Uredospori  $22-30 \times 18-26 \mu$ . Teleutospori  $40-50 \times 15-17,5 \mu$ . Mezospori  $35-40 \times 14-17 \mu$ . *Gazdă nouă*.

43. *P. taraxaci* (Rebent.) Plowr. pe frunze de *Taraxacum officinale* Web., Durău, 5.VII.1968. Uredospori  $24-30 \times 18-25 \mu$  (fig. 14).

44. *P. urticae-caricis* Kleb. pe frunze de *Urtica dioica* L., Durău, 5.VII.1968, 30.VIII.1969. Ecidiospori  $21-24 \times 18-20 \mu$  (fig. 15).

45. *P. virgaureae* (DC.) Lib. pe frunze de *Solidago virgaurea* L., Durău, 30.VIII.1969. Teleutospori unicelulari  $28-30 \times 21-25 \mu$ , bice-lulari  $34-42 \times 17-20 \mu$ , trice-lulari  $35-40 \times 16-21 \mu$  (fig. 16).

#### DEUTEROMYCETES

46. *Coniothyrium helebori* Cke et Mass. pe frunze de *Heleborus pur-purascens* W. et K., schitul Durău, 10.VII.1969. Picnidii  $175-210 \mu$ . Spori  $5-7,5 \times 3,5-4,5 \mu$ .

47. *Ascochyta graminicola* Sacc. pe frunze de *Holcus lanatus* L., Izvorul Muntelui, 13.VII.1968. Picnidii  $100-112 \mu$ . Spori  $11-18 \times 3-4 \mu$ . *Gazdă nouă*.

48. *A. lathyri* Trail pe frunze de *Lathyrus pratensis* L., Durău, 3.VII.1968. Picnidii  $120-200 \mu$ . Spori  $10-19 \times 4-5,5 \mu$ . *Gazdă nouă*.

49. *Stagonospora atriplicis* (West.) Lind. pe frunze de *Atriplex hortense* L., schitul Durău, 4.VII.1968. Picnidii  $80-93 \mu$ . Spori  $18-22 \times 3-6 \mu$  (fig. 17).

50. *S. meliloti* (Lasch) Petr. pe frunze de *Trifolium alpestre* L., Durău, 2.VII.1968, 10.VII.1969. Picnidii  $160-175 \mu$ . Spori  $16-21 \times 5-6,5 \mu$ . *T. montanum* L., Durău, 3.VII.1968. Spori  $18-30 \times 4-6 \mu$ .

51. *Septoria anthyllidis* Sacc. pe frunze de *Anthyllis vulneraria* L., Durău, 5.VII.1968. Picnidii  $94-105 \mu$ . Spori  $28-31 \times 1,5-2 \mu$ .

52. *S. inconspicua* B. et C. pe frunze de *Pimpinella major* (L.) Huds., Durău, 4.VII.1968. Picnidii  $84-90 \mu$ . Spori  $18-30 \times 1-1,5 \mu$  (fig. 18). *Gazdă nouă*.

53. *S. cirsii* Niessl pe frunze de *Cirsium erysithales* (Jack.) Scop., Durău, 3.VII.1968. Picnidii  $140-160 \mu$ . Spori  $26-60 \times 1-1,5 \mu$ .




Fig. 2. — *Colesporium campanulae* (Pers.) Lév.




Fig. 1. — *Ustilago erameri* Körn.




Fig. 3. — *Coleosporium senecionis* (Pers.) Fr. f. *sp. senecionis-nemorensis* Wagn.




Fig. 4. — *Phragmidium rubi* (Pers.) Wint.




Fig. 5. — *Uromyces geranii* (DC.) Fr.




Fig. 6. — *Uromyces rumicis* (Schum.) Wint.






Fig. 7. — *Puccinia betonicae* (Alb. et Schw.) DC.




Fig. 8. — *Puccinia ferruginosa* Syd.




Fig. 9. — *Puccinia menthae* Pers. f.sp. *calaminthae* Cruchet.




Fig. 10. — *Puccinia nigrescens* Kirchn.




Fig. 11. — *Puccinia pimpinellae* (Str.) Mart.




Fig. 12. — *Puccinia poarum* Niels.



Fig. 13. — *Puccinia prenanthis-purpureae* (DC.) Lindr.




Fig. 14. — *Puccinia taraxaci* (Rebent.) Plowr.




Fig. 15. — *Puccinia urticae-caricis* Kleb.




Fig. 16. — *Puccinia virgaureae* (DC.) Lib.




Fig. 17. — *Stagonospora atriplicis* (West.) Lind.






Fig. 18. — *Septoria inconspicua* B. et C.



Fig. 20. — *Cercospora radiata* Fuck.Fig. 19. — *Cladosporium herbarum* (Pers.) Lk.

54. *S. orchidearum* West. pe frunze de *Listera ovata* (L.) R. Br., Durău, 3.VII.1968. Picnidii 145–185  $\mu$ . Spori 21–26  $\times$  1–2  $\mu$ .

55. *S. populi* Desm. pe frunze de *Populus* sp., Durău, 5.VII.1968. Picnidii 170–178  $\mu$ . Spori 35–45  $\times$  2–2,5  $\mu$ .

56. *Ovularia obliqua* (Cke) Oudem. pe frunze de *Rumex obtusifolius* L., cabana „7 Noiembrie”, 1.IX.1969. Conidiofori 20–40  $\times$  2,5–3,5  $\mu$ . Conidii 18–23  $\times$  4–5  $\mu$ .

57. *Ramularia geranii* (West.) Fuck. pe frunze de *Geranium palustre* Torn., cabana „7 Noiembrie”, 1.IX.1969. Conidiofori 18–21  $\times$  2–4  $\mu$ . Conidii 12–17  $\times$  2,5–3,5  $\mu$ .

58. *R. lactea* (Desm.) Sacc. pe frunze de *Viola silvatica* Fr., Durău, 30.VIII.1969. Conidiofori 21–25  $\times$  2,5–3,5  $\mu$ . Conidii 8–17  $\times$  2–3  $\mu$ . *Gazdă nouă*.

59. *R. macrospora* Fres. pe frunze de *Campanula rapunculoides* L., Izvorul Muntelui, 5.IX.1969. Conidii 25–38  $\times$  6,5–8  $\mu$ .

60. *Cladosporium herbarum* (Pers.) Lk. pe frunze de *Campanula trachelium* L., Durău, 30.VIII.1969. Conidiofori 70–105  $\times$  7–9  $\mu$ . Conidii 9–12  $\times$  2–3,5  $\mu$  (fig. 19). *Gazdă nouă*. *Festuca rubra* L., Ocolașul Mic, 2.IX.1969. Conidiofori 95–115  $\times$  9–12  $\mu$ . Conidii 10–14  $\times$  3–4  $\mu$ . *Trifolium alpestre* L., Durău, 2.VII.1968, 30.VIII.1969. Conidii 10–28  $\times$  7–11  $\mu$ . *Gazdă nouă*. *T. pannonicum* L., Durău, 3.VII.1968. Conidii 17,5–21  $\times$  7–9  $\mu$ . *Gazdă nouă*. Pe ramuri de *Corylus avellana* L., Durău, 2.VII.1968. Conidii 10–20  $\times$  5–6,5  $\mu$ . *Gazdă nouă*.

61. *C. typharum* Desm. pe frunze de *Typha schuttleworthii* Koch et Sonder, Durău, 4.VII.1968. Conidiofori 100–140  $\times$  5–6  $\mu$ . Conidii 14,5–16,6  $\times$  5,5–7  $\mu$ . *Gazdă nouă*.

62. *Cercospora radiata* Fuck. pe frunze de *Anthyllis vulneraria* L., Durău, 5.VII.1968. Conidiofori 100–110  $\mu$ . Conidii 24,5–38,5  $\times$  3–4  $\mu$  (fig. 20).

63. *Isariopsis geranii* Săvul. et Sandu pe frunze de *Geranium palustre* Torn., Izvorul Muntelui, 5.IX.1968. Spori 28–31  $\times$  6–8,5  $\mu$ . *Gazdă nouă*.

64. *Tubercularia vulgaris* Tode pe ramuri de *Ribes grossularia* L., cabana „7 Noiembrie”, 1.IX.1969. Conidii 9–11  $\times$  1,5–2  $\mu$ . *Gazdă nouă*.

Materialul se află depus la filiala Academiei Republicii Socialiste România, Iași, Centrul de biologie.

## BIBLIOGRAFIE

1. BONTEA VERA, *Ciuperci parazite și saprofite din R.P.R.*, Edit. Acad. R.P.R., București, 1953.
2. BONTEA VERA și MANOLIU AL., St. și cerc. biol., Seria botanică, 1971, 23, 3.
3. GÄUMANN E., *Die Rostpilze Mitteleuropas mit besonderer Berücksichtigung der Schweiz*, Berna, 1959.

4. MANOLIU AL., Ocrotirea naturii, 1970, 14, 1.
5. SANDU-VILLE C., LAZĂR AL. și HATMAN M., Lucr. șt. Inst. agron. „Ion Ionescu de la Brad” Iași, 1959.
6. SĂVULESCU TR., Monografia uredinalelor din R.P.R., Edit. Acad. R.P.R., București, 1953.
7. — Ustilaginele din R.P.R., Edit. Acad. R.P.R., București, 1957.

Institutul de cercetări pentru protecția  
plantelor București  
și  
Centrul de biologie Iași.

Primit în redacție la 3 februarie 1971.

## DOUĂ SPECII DE *PERONOSPORA* CORDA NOI PENTRU ROMÂNIA

DE

EUGENIA ELIADE

582.281.14(498)

L'auteur signale deux espèces du genre *Peronospora* Corda, à savoir : *P. cephalariae* Vincens et *P. danica* Gäumann, qui sont nouvelles pour la mycoflore de Roumanie.

Semnalăm prezența a două specii ale genului *Peronospora* Corda, neidentificate până în prezent în țara noastră, și anume *P. cephalariae* Vincens și *P. danica* Gäumann.

Cu acestea, numărul speciilor de *Peronospora* cunoscute în România se ridică la 211.

### *Peronospora cephalariae* Vincens, 1913

Conidioforii formează o pîslă cenușiu-brună cu nuanțe violacee pe fața inferioară a limbului. Conidioforii ies în fascicule de 4—5 prin stomate, au 250—300  $\mu$  lungime și 7—8  $\mu$  lățime, sînt dicotomic ramificați în treimea superioară, cu 3—5 ramuri, cu sterigme drepte sau ușor curbate, îngustate la capăt. Conidii ovoide, ușor papilate, de 20—32  $\times$  16—20  $\mu$  (m : 26,2  $\times$  18,9  $\mu$ ), cenușii-violacee (fig. 1). Oosporii sferici, de 30—34  $\mu$ , cu episporul verucos, brun.

*Habitat*: pe frunze de *Cephalaria uralensis* (J. Murr.) Roemer et Schultes var. *multifida* Roman, Porțile de Fier, Coasta Dunării la Gura Oglănic (la est de Gura Văii), județul Mehedinți, septembrie 1965, 23.V.1966. (leg. N. Roman).

*Răspîndirea generală*: Franța (pe *C. leucantha* Schrad. și infecțiuni artificiale pe *C. alpina* Schrad. și *C. transsilvanica* Schrad.); U.R.S.S. — R.S.S. Armeană (pe *C. gigantea* (Led.) Bobr.), Caucaz (pe *Cephalaria* sp.).

În țara noastră a fost descrisă *Peronospora cephalariae-laevigatae* Tr. Săvulescu et T. Rayss (5), parazită pe *Cephalaria laevigata* (W. et K.) Schrad., care se deosebește printr-o serie de caractere, prezentate rezumativ în tabelul nr. 1.



Fig. 1. — *Peronospora cephalariae* Vincens, conidiofori cu conidii pe *Cephalaria uralensis* (J. Murr.) Roemer et Schultes var. *multifida* Roman.

Tabelul nr. 1

Dimensiunile conidioforilor și conidiilor la cele două specii de *Peronospora* parazite pe *Cephalaria*

| Specia   | Conidiofori                                 | Conidii                                   |
|--|---|---|
| <i>P. cephalariae</i> Vincens                              | în tufe de 4—5 de 250—300 $\mu$ .           | ovoide de 20—32 $\times$ 16—20 $\mu$      |
| <i>P. cephalariae-laevigatae</i> Tr. Săvulescu et T. Rayss | izolați sau în tufe de 2—3 de 240—675 $\mu$ | elipsoidale de 18—45 $\times$ 12—31 $\mu$ |

*Cephalaria uralensis* (J. Murr.) Roemer et Schultes nu este citată în literatură (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9), (10) ca plantă-gazdă pentru *Peronospora*, iar var. *multifida* Roman a fost recent semnalată și descrisă în țara noastră (4).

#### *Peronospora danica* Gäumann, 1923

Syn.: *P. radii* de Bary f. *foliicola* Lind.

Conidioforii sub forma unei pisle albicioase-cenușii, hipofile, care se dezvoltă de la vârful frunzei, progresând și cuprinzând limbul în întregime. Conidioforii izolați sau în tufe, de 300—600  $\mu$  lungime, de 6—12  $\mu$  lățime, ramificații dicotomic, cu 3—7 ramuri; sterigmele lungi, drepte sau curbate. Conidii elipsoidale, ușor papilate, hialine sau subhialine, de 20—28  $\times$  14—20  $\mu$  (m: 25,1  $\times$  18,6  $\mu$ ) (fig. 2). Oospori necunoscuți.

*Habitat*: pe frunze de *Chrysanthemum niponicum* Hort., București, Grădina botanică — Sectorul decorativ, octombrie—noiembrie, 1970.

*Răspîndirea generală*: Danemarca (pe frunze de *Chrysanthemum segetum* L.).

Pe diferite specii de *Chrysanthemum* este menționată *Peronospora radii* de Bary, care se dezvoltă numai în capitule. La noi în țară a fost semnalată în capitule de *C. leucanthemum* L. (6).




Fig. 2. — *Peronospora danica* Gäumann, conidiofori cu conidii pe *Chrysanthemum niponicum* Hort.

Specia găsită de noi numai pe frunze se deosebește prin multe caractere de *Peronospora radii* de Bary și corespunde cu specia descrisă de E. Gäumann (1), rar citată în literatură.

Materialul se află în Herbarul micologic al Institutului de biologie „Traian Săvulescu” (BUCA) și în Herbarul microflorei Republicii Socialiste România de la Laboratorul de micologie și fitopatologie al Universității București.

#### BIBLIOGRAFIE

1. GÄUMANN E., Beiträge zu einer Monographie der Gattung *Peronospora* Corda, Zürich, 1923.
2. GUSTAVSSON A., Studies on nordic *Peronosporales*, Stockholm, 1959, I.
3. JACZEWSKI A. A., Opredelitel gribov — *Phycomycetes*, Leningrad, 1931.
4. ROMAN N., Flora și vegetația din sudul Podișului Mehedinți, Teză de doctorat, București, 1970.
5. SĂVULESCU TR. et RAYSS TSCHARNA, Ann. Mycol., 1935, XXXIII, 1—2, 1—21.

6. SĂVULESCU TR., Ann. Mycol., 1948, II, 2, 255—307.
7. SĂVULESCU TR. și SĂVULESCU OLGA, Acta bot. hort. Buc., 1963.
8. ULIANISCEV V. I. *Mikoflora Azerbaidjana, Peronosporovte gribi*, Baku, 1967.
9. VIENNOT-BOURGIN G., *Mildious, oidiums, caries, charbons et rouilles des plantes de France*, Paris, 1956.
10. VINCENS F., Bull. Soc. Mycol. France, 1913, XXIX, 174—180.

Universitatea București,  
Facultatea de biologie,  
Catedra de morfologia plantelor și patologie vegetală.

Primit în redacție la 11 ianuarie, 1971.

## ASCOMICETE DIN ROMÂNIA (I)

DE

M. TOMA

582.282. (498)

L'auteur présente 16 espèces d'Ascomycètes collectées de différentes localités de Roumanie. Les espèces *Onygena corvina* Alb. et Schw. ex Fr., *Melanospora lagenaria* (Pers.) Fuck., *Vibrisssea truncorum* Fr. et *Ciboria rufofusca* (Weberb.) Rehm. sont nouvelles pour la mycoflore de ce pays.

Ca rezultat al cercetărilor noastre micologice efectuate în ultimii ani în diferite regiuni din țară, prezentăm în această lucrare 16 specii de ascomicete. Dintre acestea, *Onygena corvina* Alb. et Schw. ex Fr., *Melanospora lagenaria* (Pers.) Fuck., *Vibrisssea truncorum* Fr. și *Ciboria rufofusca* (Weberb.) Rehm. sînt noi pentru micoflora României<sup>1</sup>. Majoritatea celorlalte specii sînt citate din foarte puține localități ale țării noastre.

### PLECTASCALES

#### *Onygena corvina* Alb. et Schw.

Corpul sporifer-sferic, de 1—2 mm în diametru, susținut de un picior albicios sau brun deschis, de 1—2 cm lungime și 1 mm grosime. Peridia albicioasă, cu verucozități pe stratul extern care, la maturitate, se exfoliază sub formă de plăci. Sporii elipsoidali, incolori sau gălbui, de 6—8/2,5 μ.

<sup>1</sup> Determinarea speciei *Melanospora lagenaria* a fost confirmată de către C. Sandu-Ville iar a celorlalte specii noi pentru țară de către Gh. Sălăgeanu.



Am găsit această specie pe păr putred de bovine în comuna Poiana Stampei (jud. Suceava), la periferia turbării Pilugani. Altitudine circa 890 m (18.X.1967) (fig. 1).




Fig. 1. — *Onygena corvina*, habitus.

#### SPHAERIALES

##### *Melanospora lagenaria* (Pers.) Fuck.

Peritecii de 0,5 mm, destul de dese. Asce lat-clavate, cu opt spori de 12—13/7  $\mu$ .

Colectată de pe corpuri sporifere putrede de *Fomes marginatus* (Fr.) Gill., în molidiş pe Dealul Rune de lângă Vatra Dornei (jud. Suceava). Altitudine circa 1050 m (23.X.1968 și 9.VII.1969).

##### *Ustulina deusta* (Fr.) Petrak

Pe cioate de *Fagus silvatica* L. în rezervația științifică Valea Galbenei din Munții Apuseni (1.VIII.1964) și în pădurea Concenit de lângă comuna Buteni (jud. Arad) (22.VIII.1969).

##### *Xylosphaera longipes* (Nitschke) Dennis

La baza stîlpilor de stejar din garduri, în comuna Buteni (jud. Arad) (22.VIII.1969) și pe cioate de *Salix alba* L. de pe malul Prutului în comuna Probota (jud. Iași) (21.IX.1969).

#### OSTROPALES

##### *Vibrissea truncorum* Fr.

Apotecii cu picior cilindric, fistulos, cenușiu-alburiu, de 0,5—1 cm lungime și 0,1 cm grosime. Partea fertilă sferică sau discoidală, cu diametru de 3—5 mm, pe fața superioară gălbui-portocalie. În stare vie partea fertilă nu are peri evidenți (așa cum greșit sînt figurați în lucrarea lui Michael-Hennig (4). Aspectul pîslor apare o dată cu pierderea apei, dar atunci aspectul general se schimbă în întregime. Asce cilindrice de 170—190/6  $\mu$ , cu opt spori filiformi, incolori, de 170/1  $\mu$ , dispuși paralel

în ască. Parafize puțin ramificate la vîrf, incolore sau gălbui, în partea terminală late de 3—4  $\mu$ .

Colectată de pe ramuri de *Picea excelsa* (Lam.) Link scufundate în apă, pe Pîrîul Roșu din rezervația științifică Tinovul Mare (Căsoi), comuna Poiana Stampei (jud. Suceava). Altitudine circa 910 m (27.VII.1967 și 23.VII.1969).

#### HELOTIALES

##### *Mitrula abietis* Fr.

Pe cetină de *Picea excelsa* (Lam.) Link, pe valea Putnei din Munții Vrancei (28.VIII.1963) și în rezervația științifică Valea Galbenei din Munții Apuseni (1.VIII.1964).

##### *Spathularia flavida* Pers. ex Fr.

Pe sol și cetină de *Picea excelsa* (Lam.) Link, în rezervația științifică Codrul secular de la Slătioara (jud. Suceava) (11.VII.1969).

##### *Cudonia circinans* (Pers.) Fr.

Pe cetină de *Picea excelsa* (Lam.) Link, în rezervația științifică Valea Galbenei din Munții Apuseni (1.VIII.1964).

##### *Piceomphale bulgarioides* (Rabenh. in Kalckbr.) Svrček

Pe conurile de *Picea excelsa* (Lam.) Link, căzute și îmbibate cu apă din pădurea de molid de pe Dealul Buzău din apropierea comunei Vama (jud. Suceava) (14.V.1964).

##### *Ciboria rufosca* (Weberb.) Rehm.

Apotecii solitare, cu picior brun-cenușiu, de 0,5—1,5 cm lungime; cupa glabră, brunie, de 0,5—0,8 cm în diametru. Asce cilindrice, la vîrf




Fig. 2. — *Ciboria rufosca*, habitus și ască cu ascospori.

rotunjite, de 65—80/5  $\mu$ , cu opt spori ovali, unicelulari, netezi, incolori, uniseriați, de 6—7/3—3,5  $\mu$ . Parafize filiforme, incolore, late de 1,5  $\mu$ .

Găsită pe solzii conurilor de *Abies alba* Mill., semiîngropați în solul umed și nisipos de pe pîrîul Țiganului, comuna Neagra Șarului (jud. Suceava). Altitudine circa 850 m (16.V.1967) (fig. 2).

## PEZIZALES

**Gyromitra infula** (Schff.) Fr.

Pe lemn putred de *Picea excelsa* (Lam.) Link, în rezervația științifică Codrul secular de la Slătioara (jud. Suceava) (11.VII.1969).

**Rhizina inflata** (Schff.) Karst.

Pe bucăți de lemn putred de *Picea excelsa* (Lam.) Link înglobate în sol umed și nisipos, comuna Poiana Stampei (jud. Suceava) (11.X.1969).

**Diseina perlata** (Fr.) Fr.

Pe sol nisipos în pădurea de molid de pe Dealul Buzău din apropierea comunei Vama (jud. Suceava) (14.V.1964).

**Sarcosphaera eximia** (Dur. et Lévl.) R. Mre.

Pe sol sub *Pinus silvestris* L. pe muntele Eva, comuna Pojorita (jud. Suceava) (14.V.1964).

**Lasiobolus ciliatus** (Schmidt ex Fr.) Boud.

Pe bălega rde cornute la marginea rezervației științifice Tinovul Mare (Căsoi), comuna Poiana Stampei (jud. Suceava) (25.X.1969).

**Urnula craterium** (Schw.) Fr.

Pe bucăți de lemn acoperite cu pământ în pădurea de foioase din apropierea comunei Epureni (jud. Bîrlad) (16.IV.1963) și în pădurea Mogoșoaia de lângă București (16.IV.1967).

Pentru toate speciile noi pentru țară s-a depus câte un exemplar în Herbarul micologic al Institutului de biologie „Traian Săvulescu” din București.

## BIBLIOGRAFIE

1. DENNIS R. W. G., *British Cup-Fungi and their allies*, Ray Soc., Londra, 1960.
2. ELIADE E., *Acta bot. hort. Buc.*, 1965, 185—324.
3. LUPOI A., *Contribuții botanice*, Cluj, 1967, 211—215.
4. MICHAEL-HENNIG, *Handbuch für Pilzfreunde*, Gustav Fischer Verlag, Jena, 1960, 2.
5. MOSER M., *Kleine Kryptogamenflora, Ascomyceten*, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1963, 2 a.
6. MUNK A., *Dansk Bot. Arkiv* (Copenhagen), 1957, 17, 1.
7. PILAT A., *Česka Myc.* (Praha), 1956, 10, 2, 141—147.
8. REHM H., *Ascomyceten — Hysteriaceen und Discomyceten*, in RABENHORST, *Kryptogamen-Flora*, Eduard Kummer, Leipzig, 1896, 3.
9. SEAVER F. J., *The North American Cup-Fungi (Inoperculates)*, Hafner Publ. Comp., New York, 1951.
10. SILAGHI GH., *Studiul sistematic, ecologic, cenologic și economic al macromicelor din regiunea Cluj*, Cluj, 1967.
11. VELENOVSKY J., *Monographia Discomycetum Bohemiae*, Sumtibus propriis, Pragae, 1934, 1—2.

Institutul agronomic „Ion Ionescu de la Brad”  
Iași,  
Catedra de botanică.

Primit în redacție la 29 ianuarie 1971.

TAXONOMIA SPECIILOR DE *SETARIA* DIN ROMÂNIA

DE

GH. DIHORU

582.542.1 (498)

As a result of morpho-taxonomic analysis, the author shows that the bristles represent the sterile peduncles and that the spikelets of *Setaria* are two-flowered, but the lower flower is male (*S. lutescens* (Weigel) Hubbard) or it is sterile (the others species).

*S. ambigua* Guss. is the most interesting of the (intraspecific) taxons. It has doubtful systematic position, but it is considered as a form of *S. verticillata* (L.) Beauv. species in this paper.

The taxonomic data about vegetative and floral organs are grouped in polytomic-dichotomic keys, which allow the identification of the spontaneous species at any given moment. The diagnoses about the keel of the sheath, the trichome of the blade and of the rachis, the articulation of the spikelets are the most certain of them all.

As regards ecology, *S. lutescens* (Weigel) Hubbard grows mostly in humid places (in valleys) rather more than *S. viridis* (L.) Beauv., while *S. verticillata* (L.) Beauv. usually is to be found in  $\pm$  ruderal places.

Alături de alte *Poaceae* (*Cynodon dactylon*, *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa crus-galli*, *Eragrostis poaeoides*, *Agropyron repens*, *Sorghum halepense*), speciile de *Setaria*<sup>1</sup> sînt foarte răspîndite în culturi, în special de prășitoare. Cu toate acestea ele nu sînt suficient de bine cunoscute, de aceea datele noastre completează și precizează cunoștințele taxonomice, care pot înlesni identificarea speciilor în diferite stadii de dezvoltare și chiar după organe separate.

Speciile spontane (*Setaria lutescens*, *S. verticillata*, *S. viridis*) au fost cercetate pe material viu în toată perioada de vegetație. Am adăugat și specia cultivată, *S. italica*, pentru care am analizat material conservat.

<sup>1</sup> Autorii americani folosesc pentru acest gen denumirea *Chaetochloa* Scribner (1897).

## SCURTĂ CARACTERIZARE MORFOLOGICĂ

Speciile de *Setaria* din țara noastră sînt plante anuale, fără axe subterane. Ligula este transformată spre vîrf în lacinii piliforme (apare ca un șir de peri). În tecile inferioare se găsesc obișnuit parafie, uneori și lăstari floriferi.

Inflorescența este o paniculă cu ramurile contrase (paniculă spici-formă), care poartă un singur spiculeț fertil (inflorescență tip racem) sau mai multe (inflorescență tip paniculă). Unele ramuri au rămas lungi și sterile, cunoscute sub numele (poate mai puțin adecvat) de *sete* sau (neinspirat) de *sete involucale*. Că acestea sînt ramuri sterile o dovedesc indivizii anormali de *Setaria viridis*, la care unele sete dezvoltă apical spiculețe (cu trei glume în loc de două) (pl. II, fig. 4). Adăugăm și faptul că setele poartă același tip de aculei ca axul și ramurile fertile (de exemplu *Setaria verticillata*); la *Setaria lutescens*, în afară de spiculețul fertil, se formează uneori 1—2 spiculețe sterile în fasciculele de sete (pl. II, fig. 1, c). Setele nu cad la maturitate, spre deosebire de cele de la *Pennisetum*<sup>2</sup>.

Spiculețele sînt biflore, dar numai floarea superioară este ♂, cea inferioară fiind sterilă (*Setaria verticillata*, *S. viridis*), sau ♂ (*S. lutescens*). Această floare este considerată eronat uneori ca a treia glumă, deoarece palea este greu de observat. Lema și palea florii ♂ sînt sclerificate și ruгоase (cel puțin parțial).

## CONSIDERAȚII TAXONOMICE

Analiza materialului viu și conservat a evidențiat unele caractere utile la identificarea speciilor, dar — în același timp — a condus la constatarea că unii taxoni (mai ales intraspecifici) nu-și justifică existența sau rangul.

În separarea taxonilor s-au folosit — după cum indică literatura de specialitate — culoarea plantelor, aculeii setelor, numărul, culoarea și lungimea setelor, lungimea glumelor etc. Vom indica taxonii semnalati în flora României pentru fiecare specie în parte:

1. *Setaria lutescens* (Weigel) Hubbard

(= *Setaria glauca* auct.)

f. *vivipara* (Ciocârlan et Chirilă) — spiculețe vivipare, mai numeroase pe tulpina principală (Muntenia).

În unele regiuni ar putea fi identificată și f. *pumilla* (Poiret) — plantă scundă (4—8 cm), cu panicul redus, alcătuit din 5—6 spiculețe.

2. *Setaria verticillata* (L.) Beauv.

Taxonul mult controversat din sfera de variație a acestei specii este *Setaria ambigua* Guss. (= *S. decipiens* C. Schimp.). Aceasta nu este decît o abatere a speciei *Setaria verticillata*, de aceea o considerăm ca

<sup>2</sup> Acest gen va fi tratat într-o altă lucrare.

o formă a sa. Aculeii setelor și axului sînt antrorși (nu retrorși ca la *S. verticillata*), dar celelalte diagrame (trihomul laminelor foliare, numărul setelor lingă spiculețe (1—2(3)), teaca acută sub lamină și ciliată etc.) sînt similare cu cele de la *Setaria verticillata*.

Se cunosc următorii taxoni:

a) f. *ambigua* (Guss.) Boivin — aculeii setelor și axului antrorși (Banat; Delta Dunării (leg. G. Negreanu));

b) f. *brevisetata* (Godr.) — sete lungi de 2—3 mm, nu sau abia depășesc spiculețele (Banat);

c) f. *colorata* (A. Br.) (= f. *arenosa* Schur) — asemănătoare cu precedentă, dar tecile și glumele sînt roșii (Banat);

d) f. *robusta* (A. Br.) — frunze pînă la 2 cm lungime; ramurile paniculului pînă la 1 cm lungime, ± patule, încît paniculul apare lobat (Banat);

e) f. *schultzei* A. Schwarz — sete și spiculețe purpurii (Banat);

f) f. *major* (Bujorean) — plantă robustă (± 120 cm), cu paniculul lobat și aculeii setelor și axului antrorși. Pare o ecoformă sezonieră de la f. *ambigua* (Banat).

3. *Setaria viridis* (L.) Beauv.

a) f. *reclinatum* (Vill.) Aschers. et Graebn. — sete de 2—3 ori mai lungi decît spiculețele verzi. După părerea noastră aceasta reprezintă tipul special (Banat, Muntenia);

b) f. *weinmannii* (Roem. et Schult.) (var. *laevigata* Schur) — sete și spiculețe violacee; plantă sub 50 cm înălțime;

c) f. *majus* (Gaud.)<sup>3</sup> — panicul gros, adesea lobat, frunze late, plantă robustă (—1 m);

d) f. *nodiflora* Saccardo — tulpina cu ramuri spicifere la noduri (Banat);

e) f. *ramiflora* D. N. Christ — ? panicula cu ramuri lungi, datorită cărora apare piramidală (Banat, Muntenia).

Exemplarele de *Setaria viridis* colectate din Maramureș au setele de 3—4 ori mai lungi decît spiculețele.

4. *Setaria italica* (L.) Beauv.

a) f. *longisetum* (Döll) — sete de 2—3 ori mai lungi decît spiculețele (în cultură);

b) f. *germanica* (Beauv.) (= ? f. *compacta* (Kit.)) — setele cît spiculețele sau ceva mai lungi (în cultură);

c) f. *pachystachya* (Borbás) — panicule mari, profund lobate (în cultură);

d) f. *legitima* Schur — sete purpurii, lung-exserte (în cultură).

Aproape toți taxonii infraspecifici indicați sînt, după părerea noastră, simple forme ecologice. Cînd plantele cresc în locuri mai nefavorabile (marginea drumurilor, locuri aride) au talia mai mică, paniculul mai

<sup>3</sup> În lucrări recente (13) acest taxon este apreciat ca specie (*Setaria pycnocomma* Stend.) Henr. ex Nakai, caracterizată prin: tulpină înaltă (60—150 cm), solitară sau cîteva, cu 5—10 noduri; frunze late ((6) — 8—20 (25) mm).

subțire, mai scurt și săracăcios. Dimpotrivă, când au condiții favorabile prezintă o dezvoltare luxuriantă (de unde taxonii *major*, *robusta* etc.). Culoarea setelor se păstrează constantă numai la *Setaria lutescens*, la celelalte specii pare un caracter instabil.

#### CHEIE POLITOMIC-DIHOTOMICĂ

Rezultatele cercetării noastre, precum și informațiile indicate în literatură asupra taxonomiei genului *Setaria* au fost grupate într-un sistem de chei politomic-dihotomice, care, prin numărul mare de intrări, să permită identificarea speciilor în orice stadiu de dezvoltare. Specialistului informat îi va fi ușor să remarce diagramele folosite prima dată în această lucrare. Ele se referă atât la organele vegetative, cât și la cele florale.

#### A. Organe vegetative

##### a. Plantule

- 1 — Teci păroase cel puțin în partea superioară . . . *S. verticillata*  
— Teci glabre, ciliate sau neciliate . . . 2
- 2 — Baza laminei cu peri lungi (—5 mm), subțiri; teci neciliate; prima frunză lungă de 15–20 (30) mm . . . *S. lutescens*  
— Baza laminei glabră; teci ciliate; prima frunză lungă de 10–12 mm . . . *S. viridis*

##### b. Tulpina

- 1 — Aculei retrorși sub panicul . . . *S. verticillata*  
— Aculei antrorși sub panicul . . . 2
- 2 — Tulpina fin și des sulcată sub panicul, evident scabră . . . *S. viridis*  
— Tulpina adânc și distanțat sulcată sub panicul, slab scabră . . . *S. lutescens*

##### c. Teaca

- 1 — Teacă rotunjită sub lamina foliară (pl. I, fig. 5) . . . *S. viridis*  
— Teacă carenată sub lamina foliară (pl. I, fig. 4) . . . 2
- 2 — Marginile tecii glabre . . . *S. lutescens*  
— Marginile tecii ciliate (cel puțin în partea superioară) . . . *S. verticillata*

##### d. Lamina foliară

- 1 — Fața adaxială glabră (baza laminei superioare mai îngustă decât mijlocul) (pl. I, fig. 3) . . . *S. viridis*  
— Fața adaxială dispers păroasă, cel puțin la bază (baza laminei superioare aproximativ de aceeași lățime cu mijlocul) . . . 2
- 2 — Baza laminei cu peri lungi (4–6 mm); fața adaxială ușor glaucă (pl. I, fig. 1) . . . *S. lutescens*  
— Toată fața adaxială (uneori și abaxială) a laminei cu peri scurți (0,8 mm) (pl. I, fig. 2) . . . *S. verticillata*

#### B. Organe florale (s. l.)

##### e. Paniculul

- 1 — Cilindric; ramurile cu un singur spiculeț fertil (pl. II, fig. 1, b)  
— Oblong; ramurile cu mai multe spiculețe fertile . . . *S. lutescens* 2
- 2 — Panicul scabru, întrerupt la bază (pl. II, fig. 2 și 3), întotdeauna se vede axul . . . *S. verticillata*  
— Panicul neted, neîntrerupt la bază, axul camuflat de ramuri . . . *S. viridis*

##### f. Axul paniculului

- 1 — Scabru numai pe coaste . . . *S. verticillata*  
— Păros de jur împrejur . . . 2
- 2 — Perii (evident pustulați) mai lungi decât diametrul axului . . . *S. viridis*  
— Perii (slab pustulați) mai scurți decât diametrul axului . . . *S. lutescens*

##### lutescens g. Setele

- 1 — Cu aculei retrorși . . . *S. verticillata*  
— Cu aculei antrorși . . . 2
- 2 — La maturitate au vârful auriu, mai multe de 5 într-un fascicul . . . *S. lutescens*  
— La maturitate au vârful verde sau violaceu, 1–3 într-un fascicul . . . *S. viridis* (și *S. verticillata* f. *decipiens*)

##### h. Spiculețul

- 1 — Lat de 1,6 mm și lung de 3 mm, alcătuit dintr-o floare ♂ și una ♀ (pl. III, fig. 1, A) . . . *S. lutescens*  
— Lat de 0,9–1,3 mm și lung de 2–2,5 mm, alcătuit dintr-o floare ♂ și una sterilă (atrofiată) . . . 2
- 2 — Lat de 1 mm (pl. III, fig. 1, A) . . . *S. viridis*  
— Mai lat de 1 mm (pl. III, fig. 2, A) . . . *S. verticillata*

##### i. Cicatricea spiculețului

- 1 — Cicatrice ± plană (pl. II, fig. 2) . . . *S. verticillata*  
— Cicatrice ± cupuliformă . . . 2
- 2 — Cicatrice evident mai lată decât pedunculul, care este patul păros și lung de 0,35–0,40 mm (pl. II, fig. 3) . . . *S. viridis*  
— Cicatrice abia mai lată decât pedunculul, care este patent păros și lung de 0,25 mm (pl. II, fig. 1) . . . *S. lutescens*

##### j. Glumele

- 1 — Cea inferioară are marginile îndepărtate pe partea opusă a spiculețului; cea superioară (pl. III, fig. 1, C) este jumătate din lungimea lemei . . . *S. lutescens*  
— Cea inferioară are marginile apropiate sau suprapuse pe partea opusă a spiculețului; cea superioară este ± lungă cât lema . . . 2
- 2 — Marginile glumei inferioare se suprapun pe partea opusă a spiculețului (pl. III, fig. 3, C) . . . *S. viridis*  
— Marginile glumei inferioare se ating (la bază) pe partea opusă a spiculețului (pl. III, fig. 2, C) . . . *S. verticillata*



k. *Floarea superioară* (♂, fertilă)

- 1 — Stigmate alburii . . . . . *S. viridis*  
— Stigmate violacee . . . . . 2
- 2 — Lema puternic transversal rugoasă, jumătatea superioară neacoperită de gluma superioară (pl. III, fig. 1, B; pl. IV, fig. 1, A) . . . . . *S. lutescens*  
— Lema slab transversal rugoasă, în întregime acoperită de gluma superioară (pl. III, fig. 3, B; pl. IV, fig. 3, A) . . . . . *S. viridis*

1. *Floarea inferioară* (♂ sau sterilă)


- 1 — Paleea egal de lungă cu lema, cu carenele (nervurile) verzi; stamine prezente (floare ♂) (pl. IV, fig. 1, D) . . . . . *S. lutescens*  
— Paleea mult mai scurtă decât lema, fără nervuri verzi; stamine absente (floare sterilă) . . . . . 2
- 2 — Paleea circa 1/2 din lungimea lemei (pl. IV, fig. 2, D) . . . . . *S. verticillata*  
— Paleea mai scurtă decât jumătatea lemei (pl. IV, fig. 3, D) . . . . . *S. viridis*

m. *Fructul* (învelit de lemn și palee)

- 1 — Convex-concav; carenele paleii nu se îndepărtează de marginile lemei, ci se suprapun (pl. IV, fig. 1, B și 1, C) . . . . . *S. lutescens*  
— Inegal biconvex; carenele paleii se îndepărtează de marginile lemei (pl. IV, fig. 2, B și 3; fig. 2, C și 3) . . . . . 2
- 2 — Paleea ușor convexă, „fruct” mai lung de 2 mm (pl. IV, fig. 2, B) . . . . . *S. verticillata*  
— Paleea evident convexă, „fruct” mai scurt de 2 mm (pl. IV, fig. 3, B) . . . . . *S. viridis*


## CHEIE GENERALĂ

- 1 — Baza laminei cu *peri lungi* de 4–6 mm; ramurile paniculei cu *un singur spiculeț fertil* (uneori apar 1–2 spiculețe sterile, mici); gluma superioară *jumătate* din lungimea lemei; lema evident transversal *ruogoasă* (șiruri de verucozități); sete cu *vîrf auriu* la maturitate . . . . . *S. lutescens*  
— Lamina *glabră* sau cu *peri sub 1 mm*; ramurile paniculei cu *multe spiculețe fertile*; gluma superioară *egală* cu lema; lema *ușor transversal rugoasă* sau netedă; sete *verzi* sau violacee . . . . . 2
- 2 — Lamina cu *peri dispersi* (0,8 mm) adaxial; teaca cu *carenă*; stigmate *violacee*; rahis *scabru* pe muchii, vizibil în jumătatea inferioară a paniculei; aculeii setelor *retroși* (excepție f. *decipiens*) . . . . . *S. verticillata*  
— Lamina *glabră*; teaca *necarenată*; stigmate *alburii*; rahis *lung păros* de jur împrejur, camuflat de ramuri (se observă la bază numai cînd ramurile sînt reduse); aculeii setelor *antrorși* . . . . . 3
- 3 — Spiculețe cu *articulație* sub glume (cad ușor cînd sînt mature sau uscate); lema *nelucioasă*, cu șiruri de verucozități; teci *glabre*, cu excepția marginilor; spiculeț lung de 2–2,2 mm . . . . . *S. viridis*



Planșa II. — Ramurile inflorescențelor.


Fig. 1. *Selaria lutescens*: fig. 2, *S. verticillata*; fig. 3, *S. viridis*; a, fasciculul de sete; b, pedicelul de spiculeț fertil; c, pedicel de spiculeț steril; fig. 4, porțiune din ramură anormală de *S. viridis*; a, spiculețe normale; b, spiculețe dezvoltate în virful setelor; c, glumă supraumeră la aceste spiculețe; d, glumă inferioară care depășește jumătatea lemei; e, glumă superioară dezvoltată normal; f, setă cu spiculeț avortat (o); h, setă fără spiculeț.



Planșa I. — Baza laminei foliare și partea superioară a teci.

Fig. 1. *Selaria lutescens*; fig. 2, *S. verticillata*; fig. 3, *S. viridis*; fig. 4 și 5, secțiune transversală în teci.

— Spiculețe fără articulație (nu cad) sau cu o articulație slabă deasupra glumelor (glumele și floarea sterilă sînt persistente); lema lucioasă, netedă sau ușor zbircită; tecile inferioare ale lăstarilor tineri de obicei păroase. Spiculeț lung de 2,8—3 mm . . . *S. italica*



Planșa III. — Spiculețe.


Fig. 1, *Setaria lutescens*; fig. 2, *S. verticillata*; fig. 3, *S. viridis*; fig. 4, *S. italica*; A, spiculețe văzute abaxial (20×); B, spiculețe văzute din profil (10×); C, spiculețe văzute adaxial (10×); a, gluma inferioară; b, lema florii sterile; c, palea florii sterile (punctată); d, gluma superioară; e, lema florii fertile; f, nervațiunea lemei florii sterile.

#### CÎTEVA INDICAȚII ECOLOGICE

Deși sînt plante foarte răspindite în România, prin culturi, margini de drumuri, răzoare, ronduri cu flori, izlazuri, parcuri etc., prezintă totuși unele diferențe ecologice, mai evidente între *Setaria lutescens* și *S. viridis*.

*Setaria lutescens* este o specie mezofilsuhidrofila, preferînd regiunile de deal și de munte, unde adesea se înmulțește masiv în culturi sau miriști,

pe malul apelor etc. (*Echinochloo - Setarietum*). În regiunea de cîmpie nu este o raritate, dar se găsește cu precădere pe terenuri mai joase, cu umiditate sporită. Gradul său de hidrofilie se poate deduce mai ușor la cîmpie decît la deal sau la munte.



Planșa IV. — Floarea.

Fig. 1, *Setaria lutescens*; fig. 2, *S. verticillata*; fig. 3, *S. viridis*; A, lema (floare văzută adaxial) (10×); B, floare („sămînță”) văzută din profil (10×); C, floare („sămînță”) văzută abaxial (10×); D, floarea inferioară (masculă sau sterilă); a, palea; b, lema (15×).

*Setaria viridis*, dimpotrivă, prosperă în regiunea de cîmpie, unde este aproape nelipsită în toate culturile. Fructifică abundent, diseminează extrem de ușor datorită articulațiilor spiculețelor și, după cum se pare, beneficiază și de mermecohorie. Mai puțin abundentă se găsește în regiunile de munte, totuși destul de frecventă.

*Setaria verticillata* are o situație intermediară în raport cu umiditatea, dar pare a se dezvolta bine în locurile nitrogene, împreună cu alte buruieni. Se întâlnește mai ales la margini de culturi, răzoare, locuri ruderaie. Nu este așa de răspindită și abundentă ca speciile precedente deși ar fi de așteptat acest lucru, deoarece este o specie epizoohoră.

## BIBLIOGRAFIE

1. ASCHERSON P. u. GRAEBNER P., *Synopsis der Mitteleuropäischen Flora*, Leipzig, 1898—1902, 2.
2. BORZA AL., *Conspectus Florae Romaniae*, Cluj, 1947, 1.
3. BRITTON N. L. a. BROWN H. C., *An Illustrated Flora of the Northern United States, Canada and the British Possessions*, New York, 1913, 1.
4. BUJOREAN G., *Bul. Grăd. bot. Cluj*, 1946, 22, 1—4, 77—96.
5. CIOGĂRLAN V. și CHIRILĂ C., *Lucr. șt. Inst. agron. București*, 1960, 453—456.
6. HAYEK A. et MARKGRAF FR., *Prodromus Florae peninsulae Balcanicae*, Dahlem bei Berlin, 1933, 3.
7. HEGI G., *Illustrierte Flora von Mittel-Europa*, München, 1935, 1.
8. JANCHEN E., *Catalogus Florae Austriae, Ergänzungsheft*, Viena, 1963, 1; 1964, 2.
9. NYÁRÁDY A. et PÁZMÁNY D., *Acta agron. Acad. Sci. Hung.*, 1967, 18, 1—2, 1—47.
10. PRODAN I., *Flora pentru determinarea și descrierea plantelor ce cresc în România*, Cluj, 1939, 1.
11. RATHMALER W., *Exkursionsflora von Deutschland*, Berlin, 1966, 2.
12. ROJEVIČ R. I., *Gramineae*, in *Flora SSSR*, Leningrad, 1934, 1.
13. ROUY G., *Flore de France*, Paris, 1913, 14.
14. TUTIN T. G., *Gramineae*, in *Flora of the British Isles*, Cambridge, 1962.
15. ŢVELEV N. N., *Gramineae*, in *Rastenia Tentralnoi Azii*, Nauka, Leningrad, 1968, 4.
16. VASILCENKO I. T., *Vsodi sornih rastenii*, in *Sornie rastenii Tadzikistana*, Moscova—Leningrad, 1953, 1, 64—188.

Institutul de biologie „Traian Săvulescu”.

Primit în redacție la 18 noiembrie 1970.

## COSCINODON CRIBROSUS (HEDW.) SPRUCE ÎN BRIOFLORA MOLDOVEI ȘI RĂSPÎNDIREA EI ÎN ROMÂNIA

DE

GH. MIHAI

582.32 (498)

L'auteur signale la présence de l'espèce *Coscinodon cribrosus* (Hedw.) Spruce dans la Bryoflore de la Moldavie en faisant quelques considérations bryogéographiques et écologiques.

Sur la base des données bibliographiques et du matériel de la Collection Ch. J. Baumgarten de l'Université de Cluj, l'auteur arrive à la conclusion que cette espèce n'a pas été trouvée dans la localité Boița (Dép. de Sibiu). Sur le territoire de la Roumanie doivent être prises en considération pour cette espèce seulement les stations suivantes : Turda ; l'endroit situé entre Ciucea et Poieni (dans les Monts Apuseni = Occidentaux de la Roumanie) ; la vallée du Someșul Cald dans les Monts de Gilău (Dép. de Cluj) ; Roșia Montană (Dép. d'Alba) ; Monts de Parîngul ; Gura Megheș dans les Monts de Nemira (Carpathes Orientales ; Dép. de Bacău).

Din familia *Grimmiaceae* în brioflora țării noastre se cunosc patru genuri, și anume *Schistidium* Bridel., *Grimmia* Ehrh., *Racomitrium* Bridel. și *Coscinodon* Spreng. Dintre acestea genul *Grimmia* cuprinde cele mai multe specii, unele dintre ele avînd o largă răspîndire.

În ceea ce privește genul *Coscinodon*, acesta este reprezentat atît în țara noastră, cît și în toată Europa numai printr-o singură specie — *Coscinodon cribrosus* (Hedw.) Spruce. Este o specie rară nu numai pentru România, ci chiar pentru întreaga Europă, fiind răspîndită doar sporadic aproape pe întreg cuprinsul acestui continent (4), (5), (14), (15), (21), cu excepția regiunilor septentrionale. Pe teritoriul unor țări vecine cu țara noastră — U.R.S.S. (1), (14) și R. P. Ungară (3) — literatura briologică o menționează ca o specie foarte rară. De altfel, în brioflora R.P. Ungare ea a fost semnalată abia foarte recent, și anume în 1966 (3), fiind menționată numai dintr-o singură localitate. Această specie se află consemnată și în brioflora R.S. Cehoslovacă (20), (21) și R.P. Polonă (23), fiind considerată de asemenea ca foarte rară.

Prin particularitățile sale morfologice și anatomice *Coscinodon cribrosus* se apropie mai mult de speciile genului *Grimmia*. Astfel se explică și faptul că în literatura briologică mai veche (11) ea este descrisă sub denumirea de *Grimmia cribrosa* Hedw.

Cu toate acestea între cele două genuri există caractere diferențiale evidente, ceea ce ne permite să deosebim cu ușurință pe *Coscinodon cribrosus* de speciile genului *Grimmia*. Aceste particularități ies și mai bine în evidență în cazurile în care planta este găsită cu sporogoane. Un rol însemnat în determinare îl au, pe lângă frunzișoare, caracterele sporogonului, ale scufiei și dinților peristomului. În stare sterilă, prin aspectul frunzișoarelor și mai ales al perilor din vârful lor (fig. 1, *a* și *b*), precum și prin habitusul general al plantei (fig. 1, *a*) și modul de asociere al indivizilor (formind tufe dense de culoare cenușiu-verzuie sau negricioasă) se aseamănă foarte mult, putând fi chiar confundată la prima vedere, cu *Grimmia pulvinata* (L.) Sm. Aceste caractere explică de asemenea și o altă denumire în sinonimia speciei, și anume aceea de *Corcinodon pulvinatus* Spreng. (Anleit. Kenntn. Gew., III, p. 372 (1804)).

În cele ce urmează prezentăm comparativ caracterele morfologice-anatomice diferențiale ale celor două genuri:

#### *Coscinodon* Spreng.

- frunzișoare cu margini plane, numai spre vîrf adesea involute (fig. 1, *b*);
- frunzișoare în jumătatea superioară cu două strate de celule (fig. 1, *c*);
- peristom cu dinți aproape întotdeauna frecvent perforați (fig. 1, *d*);
- scufia mare, în formă de clopot, plisată longitudinal (fig. 1, *e*).

#### *Grimmia* Ehrh.

- frunzișoare cu margini revolute plane sau cîteodată involute;
- frunzișoare în jumătatea superioară cu un singur strat de celule și numai uneori bistratificate;
- peristom cu dinți de obicei întregi, rareori către vîrf despicăți sau slab perforați;
- scufia mai mică, în formă de căciulă sau rareori în formă de glugă, neplisată.

Caracterele morfologice principale, care permit deosebirea clară a acestor două genuri, aparțin în special frunzișoarelor, scufiei și dinților peristomatici.

Specia prezintă următoarele caractere esențiale:

— plantă dioică, frunzișoare prevăzute de obicei cu două cute îngroșate, paralele cu nervura; dinții peristomului de culoare roșie, perforați (cu aspect de ciur) ... *Coscinodon cribrosus* (fig. 1).

Acest gen este reprezentat pe glob printr-un număr de 10 specii (4), unele fiind monoice, iar altele dioice, majoritatea cu o răspindire mai largă în America de Nord. Printre speciile dioice se numără și *Coscinodon cribrosus*, al cărui areal geografic cuprinde, pe lângă Europa, Asia (Caucaz, Tauria, Himalia) și America de Nord.

În brioflora de pe teritoriul țării noastre, acest mușchi îl găsim amintit pentru prima dată în 1846 de către J. C. Baumgarten (2) din stațiunea Boița, în apropiere de Turnu Roșu. Din aceeași localitate mai este

citată de F. Schur (22), M. Fuss (7), A. Kanitz (13) și Fr. Hazslinszky (10). Cu toate acestea asupra existenței speciei în localitatea menționată au existat îndoieli. Astfel, Fr. Hazslinszky (10) citează acest mușchi din localitatea respectivă cu următoarea indicație: „probabil găsit de Baumgarten la Turnu Roșu”.




Fig. 1. — *Coscinodon cribrosus* (Hedw.) Spruce.

a, Planta cu sporogoane; b, frunzișoară; c, secțiune transversală în jumătatea superioară a frunzișoarei; d, un dinte al peristomului; e, scufia.

Între anii 1903 și 1904, M. Péterfi (19) publică această specie din Munții Parîng, fără însă a se specifica stațiunea exactă<sup>1</sup>.

În anul 1908, I. Györfy (8) menționează specia în unele stațiuni din Transilvania, și anume la Turda, aproape de „Băile Sărate” (leg. 28.VI.1902), Munții Gilăului, în valea Someșului Cald (leg. 17.VII.1904), din alte două stațiuni de pe valea Arieșului — Roșia Montană (leg. 11.V.1902) și Turda—Arieș (leg. 10.V.1902), materialul fiind recoltat împreună cu M. Péterfi.

Asupra stațiunii Boița din apropiere de Turnu Roșu, I. Györfy (8) arată că această localitate nu poate fi luată în considerație, deoarece în herbariul lui J. C. Baumgarten nu există material de *Coscinodon cribrosus* din acest loc. Această problemă dubioasă asupra existenței speciei *Coscinodon cribrosus* în această stațiune a fost lămurită de M. Péterfi prin revizuirea colecției botanice respective, așa după cum rezultă din corespondența dintre I. Györfy și M. Péterfi.

În colecția botanică a lui J. C. Baumgarten, care în prezent se găsește în herbariul Universității din Cluj, nu se află *Coscinodon cri-*

<sup>1</sup> Aceste date ne-au fost puse la dispoziție de către biblioteca municipiului Deva, unde se află lucrarea respectivă (în lit. nr. 625/19.XI.1969).



*brosus*<sup>2</sup>. În schimb, există material botanic, aparținând acestei specii, recoltat de M. Péterfi din localitățile Roșia Montană (leg. 11.V.1902), Turda—Arieș (leg. 8.V.1902) și de către J. Barth de la Ciucea (leg. 15.V.1887).

Într-o altă lucrare a sa, I. Györfy (9) menționează că a găsit acest mușchi între localitățile Ciucea și Poieni, actualmente situate în județul Cluj.

Noi semnalăm această specie în stațiunea Gura Megheș din Munții Nemirei (jud. Bacău) (leg. V. Barabás, 18.V.1968). Până în prezent această specie nu a fost găsită în brioflora Moldovei. Acest mușchi se dezvoltă pe stînci, crescînd în pernițe dese, albicioase, din cauza perilor lungi din virful frunzișoarelor. Materialul recoltat cuprinde exemplare bine dezvoltate, avînd capsule mature cu scufie. În pernițele de *Coscinodon cribrosus* s-au găsit și cîteva tulpinițe de *Homalothecium sericeum* (L.) Br. eur. și de *Thuidium recognitum* (Hedw.) Lindb., lipsite însă de sporogoe.

Exemplarele aparținînd speciei *Coscinodon cribrosus* se încadrează bine în diagnoza acestui taxon, ne prezentînd variații sesizabile.

În ceea ce privește substratul, literatura de specialitate menționează că acest mușchi se dezvoltă pe roci silicioase în locuri uscate sau umede (5), (12), pe roci calcaroase puternic însoțite (6), (16), pe roci granitice (21), (23) sau pe gresii (3).

În stațiunea semnalată de noi, situată în Munții Nemirei, se găsește pe roci alcătuite din gresie de Tarcău (17).

Din punct de vedere ecologic, *Coscinodon cribrosus* este considerat (3) ca un mușchi xerofil, heliofil, saxicol și calcifob, făcînd parte din grupa mușchilor cu creștere în pernițe — *Bryochamaephytia pulvinata*. În R.P. Ungară (3) este menționat ca un mușchi caracteristic alianței *Asplenio—Festucion glaucae*.

În privința răspîndirii geografice, această specie face parte dintre elementele holarctice circumboreale (3), (14).

În brioflora României, *Coscinodon cribrosus* se cunoaște cu siguranță numai în următoarele stațiuni: Turda, între Ciucea și Poieni; în Munții Gilăului, pe valea Someșului Cald (jud. Cluj); Roșia Montană (jud. Alba); Munții Parîngului; Moldova de la Gura Megheș (Munții Nemirei — jud. Bacău) (fig. 2).

Pe baza celor arătate mai înainte stațiunea de la Boița din apropiere de Turnu Roșu (jud. Sibiu), citată de J. C. Baumgarten, nu mai poate fi luată în considerație.

Prin găsirea acestei specii în brioflora Moldovei se completează răspîndirea ei în țară (fig. 2) și totodată arealul său geografic din sud-estul Europei.

<sup>2</sup> Aceste informații ne-au fost date de către E. Plămădă de la Centrul de cercetări biologice din Cluj (în lit. 25.X.1969), căruia îi mulțumim și cu această ocazie.




Fig. 2. — Distribuția geografică a speciei *Coscinodon cribrosus* (Hedw.) Spruce în România.

## BIBLIOGRAFIE

1. ABRAMOVA A. L. *Opredeleli listostebelnih mhov arktiki SSSR*, Moscova—Leningrad, 1961.
2. BAUMGARTEN J. C., *Enumeratio stirpium magno Transsilvaniae Principatus, Cibinii*, 1846, IV, 81.
3. BOROS Á., *Bryogeographie und Bryoflora Ungarns*, Budapesta, 1968.
4. BROTHERUS F. V., *Bryales*, II, Spezieller teil, in ENGLER A. u. PRANTL K., *Die Nat. Pflanzenfamilien*, Leipzig, 1924, X, 1, partea I.
5. DE SLOOVER L. J. et DEMARET F., *Flore générale de Belgique — Bryophytes*, Bruxelles, 1968, II, 1.
6. GAMS H., *Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa*, Jena, 1940.
7. FUSS M., *Arch. Ver. Siebenbürg. Landes.*, 1887, XIV, 2, 978.
8. GYÖRFFY I., *Mag. Bot. Lap.*, 1908, VII, 137—140.
9. — *Folia Cryptog.*, 1924, I, 1, 25.
10. HAZSLINSZKY FR., *A magyar birodalom moh-flórája*, Budapesta, 1885.
11. HEDWIG J., *Species muscorum frondosorum*, Leipzig, 1801, 76.
12. HUSNOT T., *Muscologia Gallica*, Paris, 1884—1890.
13. KANITZ A., *Erd. Muz.*, 1876, III, 10, 172.
14. LAZARENKO S. A., *Opredeleli listvennih mhov Ukraini*, Kiev, 1955.
15. LIMPRICHT K. G., *Die Laubmoose Deutschl., Öst. u. d. Schweiz*, in RABENHORST'S, *Kryptogamenflora*, Leipzig, 1890, 4, partea I.
16. MIGULA W., *Kryptogamen-Flora von Deutschland, Öst. u. d. Schweiz*, Gera, 1904, 1.
17. \* \* \* *Monografia geografică a R.P.R., Geografia fizică*, Edit. Acad. R.P.R., București, 1960, I.
18. PAPP C., *Anal. Acad. Rom., Mem. Sect. șt.*, 1943, seria a III-a, XVIII.
19. PÉTERFI M., *A Hunyadmeg. tört. és rég. tars.*, 1903—1904, XIV, 93.
20. PILOUS Z. a DUDA J., *Klíč k určování mechorostů*, ČSR, Praga, 1960.
21. PODPĚRA J., *Conspectus Muscorum Europaeorum*, Praga, 1954.
22. SCHUR F., *Enumeratio plantarum Transsilvaniae*, Vindobonae, 1885.
23. SZAFRAN B., *Mchy (Musci)*, Varșovia, 1957, I.
24. ȘTEFUREAC I. TR., *Anal. Acad. Rom., Mem. Sect. șt.*, seria a III-a, 1941, XVI, 27.
25. — *Studii briologice în unele formațiuni de vegetație din România*, Edit. Academiei, București, 1969.

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași,  
Laboratorul de botanică, Catedra de botanică.

Primit în redacție la 20 martie 1970.

## RĂSPÎNDIREA SPECIILOR *BARTSCHIA ALPINA* L. ȘI *GENTIANA FRIGIDA* HAENKE ÎN CARPAȚII ROMÂNEȘTI

DE

A. POPESCU

582.936 (498)

În vorliender Arbeit wird eine kurze Charakterisierung der allgemeinen Verbreitung folgender Arten gegeben: *Bartschia alpina* L. und *Gentiana frigida* Haenke. Aufgrund der Sammlungsbelege, der Fachliteraturdaten und der eigenen Untersuchungen, wurde die Chorologie dieser zwei Arten aus den rumänischen Karpaten festgestellt, und auch eine Karte ihrer Verbreitung aufgestellt.

*Bartschia alpina* este un element boreal, destul de răspîndit în regiunea arctică a Europei, Asiei și a Americii de Nord. În regiunile temperate ale Europei, planta crește numai în munții înalți, la altitudine de peste 1500 de m, acolo unde specia găsește condiții optime de dezvoltare, asemănătoare cu cele din regiunile nordice. În centrul Europei *Bartschia alpina* este cunoscută din Munții Alpi, Pirinei, Sudeți, Carpați, trece apoi în Peninsula Balcanică, fiind întâlnită în regiunea alpină a munților din această parte a continentului. Rezultă că specia are un areal general destul de mare, situat însă numai în emisfera nordică.

În Carpații românești (fig. 1), *Bartschia alpina* este relativ destul de răspîndită, dar numai în masivele cele mai înalte, fiind frecventă în pajistile alpine și subalpine. În nordul țării, specia crește la altitudini mai joase, circa 1500 m, cum este cazul Munților Maramureș, iar în Carpații sudici între 1700 și 2200 m, exceptînd Munții Mehedinți (muntele Oslea), unde a fost recoltată de la 1500 m. În Munții Apuseni *Bartschia alpina* este cunoscută numai de pe Muntele Mare, unde crește la altitudinea de 1700—1800 m. Celelalte culmi avînd înălțimi sub 1500 m nu asigură condiții optime de dezvoltare acestei specii, fapt care explică absența sa din celelalte masive.

Deoarece localitățile Borșa (Munții Rodnei), Sinaia (Munții Bucegi) Racovița și Avrig (Munții Făgăraș) sînt situate mult sub altitudinea mi-

nimă de dezvoltare a speciei, credem că autorii care au botanizat în aceste locuri se referă la munții din apropierea localităților respective.

Deși răspîndită numai în etajul subalpin și cel alpin inferior, *Bartschia alpina* este destul de frecventă în Carpații românești, intrînd în componența a numeroase asociații ca: *Festucetum carpaticae*, *Loiseleurietum procumbentis* etc. Este frecvent întîlnită în pajiștile de pe brîne și de pe pantele puternic înclinate.

*Gentiana frigida* Haenke este un element alpino-carpatic, cu arealul general destul de restrîns în regiunea alpină a Munților Alpi și Carpați. În țara noastră crește în regiunea alpină superioară, în general la peste 2000 m altitudine (fig. 2). Fiind o plantă strict adaptată la condiții de climă alpină, pînă în prezent este cunoscută numai din cinci masive muntoase, și anume Munții Rodnei, Munții Ciucas, Munții Bucegi, Munții Făgăraș și Munții Retezat.

Din Munții Rodnei, singurul masiv din Carpații răsăriteni unde este cunoscută această specie, a fost recoltată de pe vîrfurile Ineu la altitudine de peste 2200 m.

Din Munții Ciucas, planta a fost recoltată de J. C. Baumgarten în anul 1817, de pe vîrfurile Zăganu de la altitudinea de circa 1880 m. Mai recent, specia nu a mai fost regăsită, astfel că în lucrările mai noi referitoare la flora acestor munți nu mai este menționată, ceea ce ne conduce la concluzia că, probabil, taxonul a dispărut din această regiune.

*Gentiana frigida*, deși este în general sporadic răspîndită în masivele amintite, totuși a fost mai des semnalată din Munții Bucegi și Făgăraș în zona alpină superioară, iar mai recent din Munții Retezat (16).

*Gentiana frigida* este o specie apropiată din punct de vedere sistematic de *G. froelichii* Jean, cunoscută numai din Austria (Karawanken și Steiner Alpen).

Din secția *Frigidae* Grossh., pe lângă cele două specii (*Gentiana frigida* și *G. froelichii*), mai fac parte încă două specii, și anume *G. algida* Pall., răspîndită în partea asiatică a U.R.S.S. din Altai pînă la Oceanul Pacific, precum și în arhipelagul Japonez, și *G. romanzovii* Ldb., răspîndită în partea nord-estică a Asiei (Kamceatka, Ciuhotka) și în nord-vestul Americii de Nord (Alaska).

Pentru cunoașterea răspîndirii celor două specii, pe lângă literatura de specialitate care a fost folosită, au mai fost consultate și o serie de herbarii<sup>1</sup>.

*Răspîndirea speciei Bartschia alpina* L. în Carpații din România

Munții Țibleșului: Arsu (8), (12), (26); Țibleș (8), (12), (26).

<sup>1</sup> Hb. Baumg. = Herbarul J. C. Baumgarten, în herbarul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj; Hb. Bruck. = Herbarul Muzeului Bruckenthal din Sibiu; Hb. CCB Cluj = Herbarul Centrului de cercetări biologice Cluj; Hb. Fuss = Herbarul M. Fuss, în herbarul Muzeului Bruckenthal din Sibiu; Hb. IBTS = Herbarul Institutului de biologie „Traian Săvulescu” București; Hb. INCEF = Herbarul Institutului de cercetări forestiere București; Hb. Inst. Agr. Buc. = Herbarul Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu” București; Hb. Kays. = Herbarul Kayser, în herbarul Muzeului Bruckenthal din Sibiu; Hb. Porcius = Herbarul Fl. Porcius, în herbarul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj; Hb. Soc. = Herbarul Societății ardelenice de științe naturale, în herbarul Muzeului Bruckenthal din Sibiu; Hb. Univ. Buc. = Herbarul Universității din București; Hb. Univ. Cluj = Herbarul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj; Hb. Ungar = Herbarul K. Ungar, în herbarul Muzeului Bruckenthal din Sibiu.




Fig. 1. — Răspîndirea speciei *Bartschia alpina* L. în flora României.  
 1, Tibles; 2, Pop Ivan; 3, Pietrosul Mare; 4, Corbele Pietrosului; 5, Cormaia; 6, Corongis; 7, Ineu; 8, Rarău;  
 9, virful Toaca; 10, virful Ciucaș; 11, Muntele Roșu; 12, Piatra Mare; 13, Postăvarul; 14, Piatra Craiului;  
 15, Caraiman; 16, Jepii Mari; 17, Bucșolu; 18, Lăptici; 19, Virful cu Dor; 20, muntele Breaza; 21, Arpaș;  
 22, valea Doamnei; 23, Podragu; 24, Negoiul; 25, Suru; 26, Iezărul Cibinului; 27, Bălescu; 28, Tîdvele;  
 29, Cîlcescu; 30, Nopteasa; 31, Mirul Mare; 32, Petroșani; 33, Bucura; 34, Căstura; 35, coasta Lăpuș-  
 nicului; 36, Piatra Iorgovanului; 37, Godeanu; 38, Tarcu; 39, Oslea; 40, Muntele Mare.






Fig. 2. — Răspîndirea speciei *Gentiana frigida* Haenke în flora României.  
 1, Virful Ineu; 2, Zăganu; 3, Caraiman; 4, Coștila; 5, virful Omu; 6, Jepii Mici; 7, Urlea; 8, Podrăgel;  
 9, Vinătoarea lui Buteanu; 10, Arpaș; 11, Bilea; 12, Bilea Lac; 13, Porumbacu; 14, Negoiul; 15, Custura  
 Retezatului; 16, Peleaga; 17, coasta Lăpușnicului.

*Munții Maramureșului* : Pietrosul Mare (N. Filarrzki et S. Jávorka, 1907, Hb. Univ. Cluj); Pop Ivan (31). Groapa Dzului sub Farcău (31); Tomnatec (31).

*Munții Rodnei* : Borșa (A. Coman, 1939, Hb. Univ. Cluj și Hb. INCEF); Corongiș (9), (12) (A. Czetz, 1852, Hb. Univ. Cluj și Hb. INCEF); Herzog, 1858, Hb. Fuss; Al. Borza, 1929, Hb. Univ. Cluj; A. et E. I. Nyárády, 1942, Hb. Univ. Cluj; J. C. Baumgarten, 1836, Hb. Baumg.); Corbele Pietrosului (12) (A. Coman, 1932, Hb. Univ. Cluj); Cormaia (12) (A. et E. I. Nyárády, 1948, Hb. IBTS); Muntele Cailor (31); Piatra Albă (31); Ineu (13); Muscheta (12); Obârșia Rebrii (E. I. Nyárády, 1942, Hb. Univ. Cluj); Pietrosul Mare (12), (31); Putredu (I. Prodan, 1907, Hb. IBTS); vârful Repedea (E. I. Nyárády, 1942, Hb. Univ. Cluj; A. et E. I. Nyárády, Hb. IBTS); Știol (12) (Al. Borza, 1925, Hb. Univ. Cluj; A. Coman, 1937, Hb. Inst. Agr. Buc.); Munții Rodnei, fără localitate (13), (21) (Fl. Porcius, Hb. Porcius; Dsaminie, Hb. Univ. Cluj).

*Munții Rarău* (24).

*Munții Ceahlău* : vârful Toaca (M. Toma, 1961, Hb. Inst. Agr. Buc.); fără localitate (11), (12), (17).

*Munții Ciucas* : vârful Ciucas (18); Muntele Roșu (9), (12), (26); fără localitate (29).

*Munții Bîrsei* : Piatra Mare (1), (12); Postăvarul (9), (12), (21) (Krieger, 1911, Hb. Univ. Cluj, Piatra Craiului (9), (26)) (Z. Zoltan, 1904, Hb. Univ. Cluj; Golesecu, 1907, Hb. INCEF; Al. Borza, 1924, Hb. Univ. Cluj), valea Crăpătura (J. Römer, cf. (12), (30), pentru f. *parviflora*).

*Munții Bucegi* : Bătrîna (23) (Al. Borza, 1926, Hb. Univ. Cluj); Babele (23); Buceșoiu (12) (J. Römer, 1888, Hb. Univ. Cluj; C. C. Georgescu, 1938, Hb. INCEF); Coștila (12), (23); Caraiman (10), (11), (12), (23) (Al. Borza, 1925, Hb. Univ. Cluj); Brîna Caraimanului (C. C. Georgescu și P. Cretzoiu, 1947, Hb. INCEF); Cocora (23); Vârful cu Dor (12); Guțanu (12) (Al. Beldie, 1942, Hb. INCEF); Izvorul Dorului (Al. Beldie, 1942, Hb. INCEF); Jepii Mari (I. Prodan, 1906, Hb. IBTS); Jepii Mici (12), (23) (G. P. Grințescu, 1946, Hb. IBTS; I. Șerbănescu, 1948, Hb. IBTS; Al. Beldie, 1942, Hb. INCEF); Lăptici (9); Colții Morarului (23); muntele Obârșia (23); Piatra Arsă (2) (A. Popescu, 1963, Hb. Univ. Buc.); Schitul Ialomița (12) (Al. Borza, 1925, Hb. Univ. Cluj); Sinaia (Al. Borza, 1922, Hb. Univ. Cluj); Valea Albă (23); fără localitate (1), (29).

*Munții Făgăraș* : Arpașu (9), (12), (25) (Kayser, 1850, Hb. Kays.); Avrig (M. Fuss, 1857, Hb. Fuss); Munții Brezei (26) (Gy. Primics, 1882, Hb. Univ. Cluj); Budislavu (9), (12), (29); Ciortea (9), (12), (26), (28) (L. Reissenberger, Hb. Fuss); vârful Moșului (12) (E. I. Nyárády, 1930, Hb. Univ. Cluj); Jghiabul Văros (26), (29); Negoitul (11), (12); Podragul (12) (I. Todor, 1948, Hb. IBTS); Podrăgel (Kladni, 1840, Hb. Soc.); Paltina (11); Racovița (19); Suru (1), (12), (26), (29) (Lerchenfeld, Hb. Bruck.; Sigerus, Hb. Bruck.); Tărlța (K. Ungar, 1919, Hb. Ungar); Vîrtopu (9); valea Doamnei (8), (26); valea Zîrnei (8), (12); fără localitate (J. C. Baumgarten, 1822, Hb. Baumg.; Kayser, Hb. Kays.; M. Schur, 1851, Hb. Fuss).

*Munții Parîng* : Bălescu (4); Bora (5); Boarnașu (4); Coasta Bengăi (5); Cilcescu (5); Cărbunele (4); Cioara (4), (5); Coasta lui Rusu (Simon, cf. (20)); Cîrja Slăveului (20); între Dengheru și Păpușa (5); Gruiu (5);

Galbenul (4); Groapa Mîndrii (Simon cf. (20)); valea Găurii (20); Iezărul (5); Ieşul (5); Igalul (5); valea Lotrului (P. Juhasz-Nagy, cf. (20)); între Mîndra şi Cîrja (5); Mohorul, versantul sudic (5); Mirul Mare (4), (5), (10), (11), (12), (20); Mierăuţu (5); Muşetoiu (4); Muntinu Mic (4); Muntinu Mare (4); Nopteasa (4); Păpuşa (4); Petrimanul (4); Purul (4); Picleşa (5); Slăveiu Mare (Simon, cf. (20)); Tidvele (4), (5); Urdele (4); valea Poliţei (Simon, cf. (20)); fără localitate (1), (26).

*Munţii Cibinului*: Iezărul Cibinului (12), (26).

*Munţii Retezat*: vîrful Bucura (16); Custura (12), (26) (E. I. Nyárády, 1929, Hb. Univ. Cluj); Lăpuşnicul Mare (E. I. Nyárády, 1924, Hb. Univ. Cluj); Paltina (E. I. Nyárády, 1924, Hb. Univ. Cluj); Piatra Iorgovanului (7), (12) (V. Soran, 1951, Hb. Univ. Cluj); Petroşani (A. Richter, 1909, Hb. Univ. Cluj); Piule (6), (7); Scorota (6), (7); Slăveiu (12) (M. Péterfi, 1908, Hb. Univ. Cluj); fără localitate (26).

*Munţii Ţarcu-Godeanu*: Ţarcu (12) (Al. Borza et I. Todor, 1942, Hb. IBTS, INCEF, Inst. Agr. Buc. şi Univ. Cluj; E. I. Nyárády, 1930, Hb. Univ. Cluj); Godeanu (10), (12); Groapa (Al. Borza et I. Todor, 1942, Hb. Univ. Cluj).

*Munţii Mehedinţi*: Oslea (12) (E. I. Nyárády, 1928, Hb. Univ. Cluj).

*Muntele Mare*: (12) (Freyn, cf. (26)).

*Răspîndirea speciei Gentiana frigida Haenke în Carpaţii din România*

*Munţii Rodnei*: vîrful Ineu (8), (13), (21), (26), (27) (A. Czetz, Hb. INCEF; A. Nyárády, 1941, Hb. Univ. Cluj); fără localitate (A. Czetz, Hb. Univ. Cluj; J. Wolff, 1855, Hb. Univ. Cluj; Fl. Porcius, Hb. Porcius).

*Munţii Ciucaş*: Zăganu (J. C. Baumgarten, Hb. Baumg.).

*Munţii Bucegi*: Babele (10); Caraiman (10), (11), (27); Coştila (10), (27); Buceşoiu (Römer, cf. (2), (27)) (P. Maez, 1905, Hb. Univ. Cluj); Jepii Mici (23); Colţii Obîrşiei (23) (Al. Beldie, 1949, Hb. INCEF); vîrful Omu (J. Römer, cf. (2)); J. Wolff 1887, Hb. INCEF; E. I. Nyárády, 1930, Hb. Univ. Cluj; Z. Zoltan, 1904, Hb. Univ. Cluj; P. Maez, 1905, Hb. Univ. Cluj); fără localitate (8), (13), (25), (29) (Kotschy, Hb. Fuss; Kladni, 1846, Hb. Soc.).

*Munţii Făgăraş*: Arpaş (8), (25), (27), (29) (M. Fuss, 1840, Hb. Fuss; Kladni, 1850, Hb. Ungar); Bilea (M. Fuss, cf. (26), (27), (29)) (A. Richter, 1908, Hb. Univ. Cluj; E. I. Nyárády, 1927, Hb. Univ. Cluj; E. Margytai, 1888, Hb. Univ. Cluj); Bilea Lac (M. Fuss, 1858, Hb. Ungar; K. Ungar, 1905, Hb. Ungar); Fundul Bilei (8) (Schur, cf. (26)); muntele Breaza (Schur, cf. (15), (27)); Crăpătura (8), (25); Vinătoarea lui Buteanu (13) (J. Wolff, 1886, Hb. INCEF; E. I. Nyárády, 1927, Hb. Univ. Cluj); Fundul Butei (8); Lespezi (J. C. Baumgarten, 1822, Hb. Univ. Cluj); Moşu (13); Negoiu (8), (11), (19), (26), (27), (29) (J. Barth, 1873, Hb. Univ. Cluj; R. Kimakovici, 1906, Hb. Ungar; Reissenberger, Hb. Fuss); Porumbacu (25); Podrăgel (25); Strunga Dracului (25); Tăriţa (8), (Baumgarten, cf. (26), (27), (29)) (J. C. Baumgarten, Hb. Fuss); Ucea Mare (8), (9), (26), (27) (J. C. Baumgarten, 1822, Hb. Baumg.); Urlea (9); valea Zirnei (8); fără localitate (F. Schur, 1851, Hb. Fuss).

*Munţii Retezat*: Custura (16), (19); Coasta Lăpuşnicului (16); vîrful Peleaga (16), (19).

## BIBLIOGRAFIE

1. BAUMGARTEN J. C., *Enumeratio stirpium magno Transsilvaniae Principatus*, Vindobonae, 1816, 1.
2. BELDIE AL., *Flora şi vegetaţia Munţilor Bucegi*, Edit. Academiei, Bucureşti, 1967.
3. BRANDZA D., *Prodromul florei române*, Bucureşti, 1879—1883.
4. BUIA AL., PĂUN M. et OLARU M., *Acta bot. hort. Buc.*, 1961—1962, 286.
5. BUIA AL., PĂUN M. şi PAVEL C., *Pajiştile din Masivul Parîng şi îmbunătăţirea lor*, Edit. agrosilvică, Bucureşti, 1962, 286.
6. CSÜRÖS ŞT., CSÜRÖS-KAPTALAN M. şi PAP S., *St. şi cerc. biol. (Cluj)*, 1956, 7, 1—4, 33—56.
7. CSÜRÖS ŞT., GERGELY I. şi PAP S., *Contribuţii botanice*, Cluj, 1962, 141.
8. FUSS M., *Flora Transsilvaniae excursoria*, Cibinii, 1866.
9. GHIŞA E., *Bul. Grăd. bot. şi al Muz. bot. Cluj*, 1940, 20.
10. GRECESCU D., *Conspectul florei române*, Bucureşti, 1898.
11. — *Conspectul florei române*, Supliment, Bucureşti, 1891.
12. GRINTESCU I., *Bartschia*, în *Flora R.P.R.*, Edit. Acad. R.P.R., Bucureşti, 1960, 6, 577.
13. HAYEK A., *Die Pflanzendecke...*, Leipzig—Viena, 1916, I.
14. HERBICH F., *Flora der Bucovina*, Leipzig, 1859.
15. NYÁRÁDY A., *Acta geobot. Hung.*, 1942, 4, 241.
16. NYÁRÁDY E. I., *Flora şi vegetaţia Munţilor Retezat*, Edit. Acad. R.P.R., Bucureşti, 1958.
17. PANȚU Z. şi PROCOPIANU-PROCOPOVICI A., *Bul. Herb. Inst. bot. Buc.*, 1901, 1, 80—131.
18. PAUCĂ A., PUŞCARU-SOROCEANU EV. şi CIUCĂ M., *Comunicări de botanică*, Bucureşti, 1960 (1957—1959), 126.
19. PAWLOWSKI B., *Bul. Grăd. bot. şi al Muz. bot. Cluj*, 1939, 19, 1—2.
20. PÓCS T., *Fragm. Bot. Mus. Hist. Nat. Hung.*, 1961, 1, 1—4, 49—128.
21. PORCIUS FL., *Anal. Soc. Acad. Rom.*, 1885, 7.
22. PRODAN I., *Flora pentru descrierea şi determinarea plantelor ce cresc în România*, Cluj, 1939, 2.
23. PUŞCARU D. şi colab., *Pajiştile alpine din Munţii Bucegi*, Edit. Acad. R.P.R., Bucureşti, 1956.
24. RACLARU P., *Comunicări de botanică*, Bucureşti, 1967, 148.
25. SCHUR F., *Enumeratio plantarum Transsilvaniae*, Vindobonae, 1885.
26. SIMONKAI L., *Enumeratio florum Transsilvaniae viculosae critica*, Budapesta, 1886.
27. ȚOPA E., *Genul Gentiana*, în *Flora R.P.R.*, Edit. Acad. R.P.R., Bucureşti, 1961, 8.
28. UNGAR K., *Die Flora Siebenbürgens*, Hermannstadt, 1925.
29. — *Die Alpenflora der Südkarpathen*, Hermannstadt, 1913.
30. VIERHAPPER FR., *Ö. B. Z. (Viena)*, 1911, 61, 107.
31. ZAPALOWICZ H., *Rostlinna szato gór Pokusko-Marmaroskich*, Cracovia, 1899.

Institutul de biologie „Traian Săvulescu”.

Primit în redacţie la 30 octombrie 1970.

RĂSPÎNDIREA SPECIILOR *PRIMULA FARINOSA* L.,  
*P. HALLERI* J. F. GMEL., *P. AURICULA* L.  
ȘI *P. INTRICATA* GREIN. ET GODR.  
ÎN FLORA ROMÂNIEI

DE

V. SANDA și A. POPESCU

582.918.3(498)

Les recherches effectuées dans les plus grandes collections botaniques roumaines, les données recueillies sur le terrain et les informations bibliographiques ont permis de rédiger une carte avec la répartition (pour la Roumanie) des espèces *Primula farinosa* L., *P. halleri* J. F. Gmel., *P. auricula* L. et *P. intricata* Grein. et Godr.

Pour chaque espèce analysée on présente des données écologiques, phytocénologiques et aréalographiques qui peuvent caractériser complètement les plantes étudiées.

Speciile de *Primula* L., care fac obiectul acestei lucrări, sînt în general elemente montane sau alpine, cu un areal relativ restrîns în Carpații din România, deși unele dintre ele sînt foarte răspîndite pe glob.

Specia cu arealul cel mai întins este *Primula farinosa* L., cunoscută din nordul Europei, precum și din regiunea alpină a masivelor montane ale Europei centrale. De asemenea este mult răspîndită în Asia, America de Nord și sudul Groenlandei. În emisfera sudică planta nu este cunoscută decît din partea extrem-sudică a Americii de Sud<sup>1</sup>.

*Primula farinosa* L. are o corogeneză legată de glaciari iar din punct de vedere genetic este un element central-asiatic (6). În prezent existența sa este legată de stațiunile turboase, precum și de mlaștinile cu izvoare reci din văile montane și submontane ((6), p. 54). La noi a fost citată pentru prima dată de la Hărman de către G. Moesz<sup>2</sup> (citată după (15)) și mai pe urmă din Țara Bîrsei de la Stupini și Prejmer de J. R ö m e r<sup>3</sup>

<sup>1</sup> G. Hegi, *Illustrierte Flora von Mittel-Europa*, Viena, 1926—1927, 5, 3.

<sup>2</sup> G. Moesz, *Nö. v. Közl.*, 1908, 7, 182—191.

<sup>3</sup> J. R ö m e r, *Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturw.*, 1911, 56.

(citată după (15)). De la Stupini, I. Morariu și *Hortensia Negruș* (13) o citează recent, crescând în asociația *Deschampsietum caespitosae*, situată la altitudinea de circa 500 m, pe un substrat aluvionar cu izvoare de apă. Aici vegetează alături de: *Saxifraga mutata*, *Parnasia palustris*, *Molinia coerulea*, *Schoenus nigricans*, *Carex flava*, *Epipactis palustris*, *Linum catharticum*, *Epilobium parviflorum*, *Lythrum salicaria*, *Polygala amara*, *Swertia perennis*, *Valeriana simplicifolia*, *Ligularia sibirica* etc.

Acste date caracterizează perfect condițiile ecologice care au permis păstrarea speciei „în stațiunile în care în prezent apare ca relict glaciatic legat de mlaștina eutrofă” (12). Stațiunile Rășinari, Suru și Ariușd mai trebuie încă verificate, deoarece în ultimul timp planta nu a mai fost regăsită (fig. 1).

*Primula halleri* J. F. Gmel. deși mai puțin răspândită decât specia precedentă totuși are un areal destul de mare, fiind răspândită în regiunea montană din centrul Europei (Alpi, Carpați), Peninsula Balcanică (Rila, Pirin) și Caucaz.

*Primula halleri* J. F. Gmel. crește la noi în pajiștile de pe platouri și de pe brânele versanților abrupti, de obicei în locurile cu un microclimat mai umed. Este o specie întâlnită în Masivul Bucegi (1) destul de rară în etajul montan superior, crescând în turbării, și sporadică în etajul alpin inferior, cu deosebire în asociațiile: *Festucetum amethystine* și *Sesleria haynaldiana*—*Carex sempervirens*, caracterizate de Al. Beldie (1) ca mezoterm-heliofile. Ca răspândire generală în țara noastră *Primula halleri* J. F. Gmel. se găsește mai frecvent în câteva masive muntoase: Rodnei, Birsei, Piatra Craiului, Bucegi, Făgăraș și Taricu-Godeanu. Lipsesc din Masivul Retezat, iar localitățile din Făgăraș sînt citate din lucrările mai vechi sau după materialele recoltate de M. F u s s, J. W o l f f, K a y s e r și G o l t z de peste 100 de ani. Se impune deci necesitatea verificării existenței actuale a speciei și în acest masiv.

*Primula auricula* L. este cunoscută din regiunea montană a Europei centrale (Alpi), Peninsula Italică (Munții Apenini), precum și din partea vestică a Carpaților (Tatra). În România specia este semnalată numai din sud-vest (Munții Mehedinți, Cernei și Vîlcan), fiind reprezentată prin subspecia endemică *serratifolia* (Roch.) Jáv. Planta crește pe stînci calcareoase, cele mai multe stațiuni găsindu-se în Munții Mehedinți (Banat). Recent, în 1968, Elena Stratul o găsește pe partea dreaptă a Cernei, muntele Bobot, iar M. Păun și Gh. Popescu (14) o citează din Cheile Sohodolului, crescând împreună cu *Ceterach officinarum*, *Asplenium trichomanes*, *A. viride*, *A. septentrionale*, *A. rutamuraria*, *Phyllitis scolopendrium*, *Parietaria serbica*, *Rumex scutatus*, *Moehringia muscosa*, *M. pendula*, *Minuartia viscosa*, *Dianthus spiculifolius*, *Sedum acre*, *Doronicum columnae* var. *glabrum* etc. Dintre stațiunile incerte, în care mai este citată specia, amintim Negrileasa (Munții Rodnei), „Gaura de Lotri” (Munții Făgăraș) și Pietrosu (Munții Bistriței) (10). Tot din literatură se cunoaște a fi răspândită și pe muntele Sturu (Munții Vîlcan).




Fig. 1. — Răspândirea speciilor *Primula intricata* Gren. et Godr., *P. farinosa* L., *P. halleri* J. F. Gmel. și *P. auricula* L. în flora României.

1, Pietrosul Rodnei; 2, Știol; 3, Ineu; 4, Corongiș; 5, Obișșia Rebrîi; 6, Rarău; 7, Borsec; 8, muntele Hăghimașul Mic; 9, Tușnadul Nou; 10, Prejmer; 11, Hărman; 12, Stupini; 13, Pasul Timiș; 14, Predeal; 15, Piatra Cristianului; 16 și 17, Caraiman; 18, Furnica; 19, Virful ou Dor; 20, Omu; 21, Buceșu; 22, Piatra Craiului; 23, Crăpătura; 24, Săua Funduri; 25, Timbalul Mare; 26, Munții Brezel; 27, Munții Cirișoarei; 28, Munții Arpașului; 29, Negoiul; 30 și 31, Suru; 32, Rășinari; 33, Tareu; 34, Piatra Cloșanilor; 35, valea Sohodolului; 36, muntele Domogled; 37, Bobot; 38, Mehadia.



*Primula intricata* Gren. et Godr. are arealul cel mai restrâns dintre speciile prezentate în această lucrare. Taxonul este cunoscut numai din Europa, crescând în regiunea alpină și cea subalpină ale munților din Europa centrală (Pirinei, Alpi, Carpați) și din Peninsula Balcanică (Pirin, Rila) etc. În România se găsește în regiunea alpină și în cea subalpină din masivele Bucegi și Piatra Craiului, în puține stațiuni<sup>4</sup>. Se confundă adesea cu *Primula elatior* (L.) Grubb. de care se deosebește printr-alte prin lungimea tubului corolei egală cu cea a caliciului, precum și prin forma laminei frunzei, îngustată treptat într-un petiol aripat.

Pentru completarea cunoașterii răspîndirii speciilor menționate au fost consultate majoritatea herbarelor din țară<sup>5</sup>.

#### RĂSPÎNDIRE

##### *Primula farinosa* L.

*Munții Giurgeului*: Borsec (12); *Depresiunea Ciucului*: Tușnadul Nou (15); *Depresiunea Bîrsei*: Stupini (10), (13), (15), Pasul Timiș (10) (Sigerus, Hb. Ungar), Ariușd (15), Rogoaze (15), între localitățile Hărman și Prejmer (15), Prejmer (10), (15); H. Furnică, 1961, Hb. IPB; M. Toma, 1967, Hb. IAI; M. Răvărut, 1950, Hb. IAI, Hărman ((7), (10), (11), (15), (16); I. Morariu, 1956, Hb. IAB, Hb. GBC, Hb. IAC și Hb. INCEF, FRE nr. 271 și 271 b; G. Negrean, 1966, Hb. MP; Moesz, 1905 și 1906, Hb. GBC; Römer, 1889 și 1901, Hb. GBC; Gh. Silaghi, 1952, Hb. GBC; E. Topa, 1949, Hb. GBC și IBTS; E. I. Nyárády, 1930, Hb. GBC; E. Lungescu, 1961, Hb. IACR; Helthman, 1957, Hb. IPB; Parascan, Lungescu, Radu, 1960, Hb. IPB; V. Lambrino, 1961, Hb. IPB; Morariu, 1954, Hb. IPB; Morariu și Ulariu, 1963 și 1964, Hb. IPB; Parascan, 1954, Hb. IPB; H. Furnică, 1954 și 1961, Hb. IPB; Römer, 1901 pentru f. *albiflora* Pax, Hb. IPB), Hărman, Dealul Sîmpetru (Morariu, Parascan și F. Negrutiu, 1959, Hb. IPB), Hărman spre Bod (Ciobanu, 1955, Hb. IPB), Hărman, locul zis „Aue” (E. Pop, I. Dumitriu-Tătăranu, 1952, Hb. IPB; V. Ciocârlan, 1958, Hb. IAB), Hărman la Fintina Rece (E. Toth, 1957, Hb. IPB), Hărman la Lempeș (Ulariu și M. Danciu, 1964, Hb. IPB), fără localitate (12); *Munții Făgăraș*: Suru (7), (10), (18); *Depresiunea Sibiului*: Rășinari (10), (17), (18).

<sup>4</sup> Prezența speciei *Primula intricata* în Munții Ceahlău nu este confirmată, deoarece singurul exemplar recoltat de aici și determinat ca *P. intricata* nu aparține acestui taxon.

<sup>5</sup> Hb. IBTS = Herbarul Institutului de biologie „Traian Săvulescu” București; Hb. IBB = Herbarul Institutului botanic București; Hb. GBC = Herbarul Grădinii botanice din Cluj; Hb. Soó = Herbarul prof. R. Soó aflat la Grădina botanică din Cluj; Hb. CCB Cluj = Herbarul Centrului de cercetări biologice Cluj; Hb. IAC = Herbarul Institutului agronomic Cluj; Hb. Fuss = Herbarul M. Fuss aflat la Muzeul Bruckenthal din Sibiu; Hb. Ungar = Herbarul K. Ungar din Sibiu; Hb. Kayser = Herbarul Kayser din Sibiu; Hb. IAT = Herbarul Institutului agronomic Timișoara; Hb. Bt = Herbarul Muzeului Banatului din Timișoara; Hb. IACR = Herbarul Institutului agronomic Craiova; Hb. IPP = Herbarul Institutului pedagogic Pitești; Hb. INCEF = Herbarul Institutului de cercetări forestiere București; Hb. Papp = Herbarul prof. C. Papp de la Grădina botanică din Iași; Hb. IAI = Herbarul Institutului agronomic Iași; Hb. UI = Herbarul Universității „Al. I. Cuza” Iași; Hb. MP = Herbarul Muzeului din Ploiești; Hb. IAB = Herbarul Institutului agronomic București; Hb. IPB = Herbarul Institutului politehnic Brașov; Hb. GBI = Herbarul Grădinii botanice din Iași; Hb. IPI = Herbarul Institutului pedagogic Iași.

**Primula halleri** J. F. Gmel.

*Munții Rodnei*: fără localitate (17), Corongiș ((9), (18); A. et E. I. Nyárády, 1942, Hb. GBC; Czetz, 1852, Hb. GBC; Herzog, Hb. Fuss; Reckert, Hb. Fuss; A. P. Alexi, Hb. Ungar), Ineu (Al. Buia, 1934, Hb. IACR), Gărgălău (10), (18), Mihăiasa (10), (18), Obîrșia Rebrii (10), (18), Pietrosul ((20); Coman, 1937, Hb. INCEF), Pietrosul Mare la Turnu Roșu ((10); A. Coman, 1938, Hb. GBC), Știol (10); *Munții Rarău*: (Papp, 1955, Hb. GBI); *Munții Giurgeului*: Hăghimașul Mic (10), (18); *Munții Bîrsei*: Pasul Timiș ((10); Sigerus, Hb. Fuss), Postăvarul (10), Predeal ((3), (7), (18), Piatra Cristianului (18); *Munții Piatra Craiului*: fără localitate ((3), (7), (9), (18); Morariu și Ulariu, 1963, Hb. IPB; Barth, 1885, Hb. Ungar; Goleescu, 1907, Hb. INCEF), Crăpătura (Römer, 1882, Hb. IPB; H. Furnică, 1956, Hb. IPB), Șaua Crăpăturii (Morariu și Helthman, 1956, Hb. IPB), Piatra Mică a Craiului ((10); Morariu, 1955, Hb. IPB; Răvăruf, 1951, Hb. IPI), Șaua Funduri (V. Ciocârlan, 1959, Hb. IAB), Brîna Caprelor spre Poiana Vlădușca (10); *Munții Bucegi*: Babele (Grecescu, Pl. Buc., 76, cf. (1)), Buceșoiu ((10); Römer, 1888, Hb. IPB), Bolboci (Morariu, 1946, Hb. IPB), Coștila ((1); Borza, Fl. Buc., 65, cf. (1)), Caraiman (Grec., Suplem., 138, cf. (1), (10), (16); Morariu, Parasca, Ciobanu, 1955, Hb. IPB; Răvăruf, 1956, Hb. IAI; Borza, 1925, Hb. GBC; Haret, 1907, Hb. INCEF; Georgescu, 1932, Hb. INCEF), Colții lui Barbeș ((10); Beldie, 1936, Hb. INCEF), Cocora ((10); Paucă, 1946, Hb. GBC), muntele Doamnele (Răvăruf, 1950, Hb. IAI), Furnica (3), (10), Muntele Grohotiș (1), Muntele Grohotiș, între Vama Guțanu și Strunga ((10); E. I. Nyárády, 1930, Hb. GBC), Izvorul Dorului ((10); Beldie, 1942, Hb. INCEF), Jepii Mici ((1); Morariu, 1954, Hb. IPB), Jepii Mari ((1); Danciu, 1965, Hb. IPB; Morariu et Helthman, 1956, Hb. IPB), valea Jepilor ((1); Răvăruf, 1956, Hb. IAI), Lăptici ((10); Beldie, 1948, Hb. INCEF), Mălăiești ((10); Römer, 1889, Hb. IPB; Parascan și Helthman, 1958, Hb. IPB), Piatra Arsă ((1), (10); I. Ciobanu, 1954, Hb. IPB; F. Keusen, 1936, Hb. MP; Moșneagă, 1961, Hb. MP; Haret, 1901, Hb. INCEF), Obîrșia (1), Omu ((1); Haret, 1906, Hb. INCEF), Valea Seacă a Caraimanului (M. Badea, 1933, Hb. INCEF), valea Ialomiței (A. Nyárády, 1954, Hb. IAC), Valea Albă (8), (10), (16), valea Cerbului (Forstner, Herb., cf. (1)), Vîrfurile cu Dor (Panțu, Contr., 23, cf. (1); Borza, Fl. Buc., 56, cf. (1), (10); Papp, 1956, Hb. GBI; Vicol, 1963, Hb. CCB Cluj; Haret, 1919, Hb. INCEF); *Munții Făgăraș*: fără localitate ((7), (10), (16), (17); J. Wolff, Hb. GBC; Goltz, Hb. INCEF), Munții Arpașului ((7), (10), (17), (18); Kayser, 1850, Hb. Kayser), Munții Brezei (10), (18), Munții Cîrțișoarei (10), Fedeleș ((10); Ungar, Hb. Ungar), Lespezi (10), Negoiiul ((7), (10), (16), (17), Suru (10), valea Doamnei ((10); Fuss, 1864, Hb. Fuss), Vîrtopel ((7), (10); Fuss, 1861, Hb. Fuss); *Munții Tarcu-Godeanu*: Muntele Baicu (10), Tarcu (9), (16).

**Primula auricula** L. ssp. *srerratifolia* (Roch.) Jáv.

*Munții Cernei*: Mehadia (Unvericht, 1857, Hb. Fuss); *Munții Mehedinți*: muntele Domogled, fără stațiune ((5), (19); Gh. Grințescu, 1939, Hb. IBTS; L. Thaisz, 1898, Hb. GBC; Heuffel, Hb. GBC), muntele Domogled la Grotă ((10); P. C. Popescu, 1955, Hb. Bt), muntele Domogled la Băile Herculane (Heuffel, Hb. Fuss; Borza, 1921, Hb. Ungar; Bujorean

și Stere, 1948, Hb. IAT; P. C. Popescu, 1956, Hb. Bt; L. Richter, 1892, Hb. IPB), muntele Domogled la Crucea Albă ((6), (10); Borza, Al. Buia, 1940, Hb. GBC; Buia, Pteancu și Todor, 1943, Hb. IAC; P. C. Popescu, 1962, Hb. Bt; Georgescu, 1936, Hb. IAB), vîrfurile Șușcului ((5), (10); Borza și Bujorean, 1920 și 1922, Hb. GBC; Borza, 1920, Hb. GBC), Poiana Ascunsă ((10); Georgescu și Badea, 1933, Hb. INCEF), Hurcu pînă la Țesna (5), Bobot (E. Stratul, 1968, Hb. Bt), valea Cernei între Schitu și Arsasca (8), (10), Poiana Mare (10), mănăstirea Apșoara (10), valea Țesnei (4), (10), Piatra Cloșanilor ((4), (5), (10); E. I. Nyárády, 1928, Hb. GBC), valea Sohodolului ((14); Păun, Cîrțu, Gh. Popescu, 1968, Hb. IACR); *Munții Vlcan*: Muntele Sturu (4), (5), (10).

**Primula intricata** Gren. et Godr.

*Munții Bucegi*: fără localitate (9), (16), Caraiman ((1); Georgescu, 1942, Hb. INCEF), valea Caraiman (Papp, 1956, Hb. GBI); Coștila în valea Mălinului (1), Buceșoiu ((1), (10), (19); Römer, 1888, Hb. IPB), valea Cerbului ((1), (10); 1911 Hb. UI), valea Mălăiești ((1), (10); Morariu, 1955, Hb. IPB), valea Obîrșiei (Morariu, Lucr. Inst. Pol., 1957, cf. (1), (10)), vîrfurile Obîrșiei ((10); Morariu, 1953, Hb. IPB), Omu (19), vîrfurile Mălinului (Morariu și Beldie, 1942, Hb. INCEF); *Munții Piatra Craiului*: ((10), (16), (19); Morariu, 1956, Hb. IBTS; H. Furnică, 1956, Hb. IPB), Țîmbalul Mare ((10); Morariu, 1956, Hb. IPB), vîrfurile Turnu și la Om (Morariu, 1956, Hb. GBC; FRE, nr. 2 962 în Hb. IAC și Hb. IPB), deasupra Brînei Caprelor (Morariu, 1955, Hb. IPB).

## BIBLIOGRAFIE

1. BELDIE AL., *Flora și vegetația Munților Bucegi*, Edit. Academiei, București, 1967.
2. BORZA AL. și BORZA V., *Bul. Grăd. bot. Cluj*, 1939, 19, 1-2, 51.
3. BRANDZA D., *Prodromul florei române*, București, 1879-1883, 410-411.
4. BUIA AL., *Ocotirea naturii*, 1959, 4, 13-42.
5. BUJOREAN G. și POPESCU P. C., *Ocotirea naturii*, 1966, 10, 1, 5-29.
6. ELIADE E., *Comunicări de botanică*, SSNG, 1965, 3, 177-190.
7. FUSS M., *Flora Transsilvaniae excursoria*, Cibinii, 1866, 534-537.
8. GRECESCU D., *Conspectul florei României*, București, 1898, 488-490.
9. HAYEK A., *Die Pflanzendecke...*, Leipzig-Viena, 1916, 435.
10. MORARIU I., NYÁRÁDY E. I. și GUȘULEAC M., *Genul Primula L.*, în *Flora R.P.R.*, Edit. Acad. R.P.R., București, 1960, 7, 95-97.
11. MORARIU I., *Ocotirea naturii*, 1964, 8, 1, 9-20.
12. —, *Ocotirea naturii*, 1966, 10, 1, 49-58.
13. MORARIU I. și NEGRUȘ H., *St. și cerc. biol.*, Seria botanică, 1970, 22, 4, 291-296.
14. PĂUN M. și POPESCU GH., *Bul. st. Univ. Craiova*, 1968, 10, 13-20.
15. POP E., *Bul. științ. Acad. R.P.R.*, Secția st. biol., agron., geol.-geogr., 1954, 6, 1, 347-406.
16. PRODAN I., *Flora pentru determinarea și descrierea plantelor ce cresc în România*, Cluj, 1939, 1, partea 2-a, 706-708.
17. SCHUR F., *Enumeratio plantarum Transsilvaniae*, Vindobonae, 1866, 552-555.
18. SIMONKAI L., *Enumeratio florum Transsilvaniae vasculosae critica*, Budapesta, 1886, 458-460.
19. UNGAR K., *Die Flora Siebenbürgens*, Hermannstadt, 1925, 356-358.
20. ZAPALOWICZ H., *Roslinna szata gór Pokusko-Marmaroskich*, Cracovia, 1889.

Institutul de biologie „Traian Săvulescu”.

Primit în redacție la 28 octombrie 1970.

## CERCETĂRI FITOCENOLOGICE ASUPRA PĂDURILOR DIN MUNȚII PLOPIȘ (II)

DE  
GH. COLDEA

581.526.42 (498)

This is the author's second paper dealing with the description of the forest vegetation of the Plopiș Mountains. There is a detailed record on the floristic composition and ecology of the following associations: *Quercetum farnetto-cerris* Georgescu 1945, *Cytiso-Quercetum* Paucă 1941, and *Genisto (tinctoriae) — Quercetum petraeae* Klika 1932 transsilvanicum Gergely 1962.

The phytocenoses of *Quercus cerris* with *Quercus farnetto* recorded herein proved that this area belongs to the so-called "Dacio-Illyric" province established by Al. Borza. At the same time the *Quercus petraeae* associations of the Plopiș Mountains exhibit in the herbaceous layer several sub-mediterranean thermophilic species.

În prezenta lucrare continuăm descrierea vegetației lemnoase din Munții Plopiș și prezentăm detaliat compoziția floristică și ecologia unor cenoze de gorun, cer și gârniță care ocupă suprafețe însemnate în partea nord-vestică a masivului. De asemenea, pe baza analizelor de polen, facem și unele precizări fitoistorice cu privire la apariția foioaselor termofile din această regiune. Asociațiile lemnoase pe care le descriem în continuare sînt încadrate în următorul cenosistem:

**QUERCETEA PUBESCENTI—PETRAEAE** Jakucs 1960

ORNO—COTINETALIA Jakucs 1960

**Quercion farnetto** Horvat 1954

1. **Quercetum farnetto-cerris** Georgescu 1945

QUECERTALIA PETRAEAE—PUBESCENTIS Jkaucs 1962

**Quercion petraeae** Zoly. et Jakucs 1957

2. **Cytiso—Quercetum** Paucă 1941

3. **Genisto (tinctoriae) — Quercetum petraeae** Klika 1932  
transsilvanicum Gergely 1962

1. *Quercetum farnetto-cerris* Georgescu 1945 (tabelul nr. 1). În teritoriul cercetat cenozele acestei asociații termofile apar sub formă de pilcuri pe platourile și pantele foarte domoale, situate în partea nord-vestică a masivului (Culmea Bistra) la o altitudine de circa 340 m s.m. Asociația vegetează pe soluri silvestre podzolice pseudogleice, slab acide (pH 5,8) și cu un conținut scăzut în humus (3,5%). Speciile lemnoase edificatoare care formează stratul arborilor sînt cerul și gîrnița. Stratul arbustiv este slab dezvoltat. În stratul ierbos se evidențiază speciile mezofile (*Poa angustifolia*, *Festuca heterophylla*, *Lysimachia nummularia*, *L. punctata*, *Ajuga reptans* ș.a.), care imprimă un colorit aparte acestor cenoze de gîrniță din nord-vestul țării (13). Pădurile de cer cu gîrniță din aceste stațiuni, care sînt situate la limita nordică a arealului lor, reprezintă stadii de „postclimaxuri”, datînd din perioada timpului călduros postglaciar. Sub aspect fitoistoric cenozele de cer cu gîrniță împreună cu speciile termofile însoțitoare (2), care circumscriu provincia daco-ilirică (1), au o origine nord-balcanică (9). Ele au migrat pe aceste meleaguri în perioada timpului călduros postglaciar (boreal-atlantic) (3). Compoziția floristică a acestor cenoze lemnoase din zona „piemonturilor vestice”, fiind în mare parte asemănătoare cu cele descrise din Podișul și Subcarpații Getici (10), (12), pune în evidență în mod indirect asemănări climatice și ecologice între aceste regiuni. Totodată, aceste cenoze ne indică deosebiri semnificative între zona piemonturilor vestice ale României și partea estică a Ungariei, care, după datele mai recente (15), se caracterizează prin lipsa gîrniței spontane. Numărul redus de specii caracteristice pentru alianță și ordin în compoziția floristică a acestei asociații care se află la limita nordică a arealului ei, comparativ cu cele descrise din sudul țării noastre (12), (13), relevă că în această regiune condițiile climatice sînt mai puțin favorabile gîrniței. În spectrul floristic al asociației predomină elementul nordic în genere (74,9%), iar în cel biologic hemicriptofitele (71,5%).

*Spectrul floristic*: Eua = 37,5%; E = 17,8%; Cp = 10,7%;  
Md = 10,7%; Ec = 8,9%; Ct = 5,4%; Cm = 5,4%; Bd = 3,6%.

*Spectrul biologic*: MM = 5,4%; M = 8,9%; H = 71,5%;  
Ch = 5,4%; Th = 5,4%; TH = 1,8%; G = 1,8%.

2. *Cytiso-Quercetum* Paucă 1941 (tabelul nr. 2). Am grupat în această asociație cenozele acidofile de gorun care populează culmile mai înalte ale dealurilor și treimea superioară a versanților sudici pînă la o altitudine de 600 m s.m. (Culmea Derna, Dealul Gorunet, Dealul Runcului, Pădurea Neagră). Solurile pe care vegetează sînt brun gălbui acide scheletice, puternic levigate, cu o reacție acidă (pH 4,9) și un conținut redus de humus (4,1%). Numărul redus de specii care formează stratul ierbos, precum și abundența — dominanța și constanța ridicată a speciilor acidofile (*Deschampsia flexuosa*, *Luzula luzuloides*, *Cytisus nigricans*, *Veronica officinalis*, *Dicranum scoparium* ș.a.) din cenozele respective ne indică aceste însușiri ale solului. Prezența unor specii termofile (*Potentilla micrantha*, *Sedum cepaea*, *Festuca drymeia* ș.a.) în compoziția floristică a acestei asociații îi imprimă un colorit sudic aparte față de asociația *Luzulo-Quercetum* (Hilitzer 1932) Passarge 1953, R. et Z. Neuh. 1967, cu care parțial se aseamănă, precum și lipsa pinului și molidului din aceste cenoze ne-a determinat să menținem asociația descrisă de A. Paucă

Tabelul nr. 1

*Quercetum farnetto-cerris* Georgescu 1945

| Forma biologică | Elementul floristic | Nr. ridicării<br>Altitudinea (m s.m.)<br>Expoziția<br>Înclinația (grade)<br>Înălțimea arborilor (m)<br>Închegarea coronamentului<br>Acoperirea stratului ierbos (%)<br>Acoperirea literei (%)<br>Suprafața analizată (m²) | 1   | 2    | 3    | 4    | 5   | K   |
|-----------------|---------------------|---|-----|------|------|------|-----|-----|
|                 |                     |   | 350 | 350  | 340  | 340  | 350 |     |
|                 |                     |   | —   | —    | S    | S    | —   |     |
|                 |                     |   | —   | —    | 3    | 5    | —   |     |
|                 |                     |   | 13  | 14   | 12   | 15   | 15  |     |
|                 |                     |   | 07  | 08   | 07   | 08   | 08  |     |
|                 |                     |   | 20  | 25   | 25   | 20   | 10  |     |
|                 |                     |   | 65  | 50   | 60   | 80   | 50  |     |
|                 |                     |   | 400 | 400  | 400  | 400  | 400 |     |
|                 |                     | Char. ass.  |     |      |      |      |     |     |
| MM              | Md                  | <i>Quercus cerris</i>   | 3.5 | 4.5  | 3.5  | 4.5  | 4.5 | V   |
| MM              | Md                  | <i>Quercus farnetto</i>   | 2.5 | 1.5  | 2.5  | 1.5  | 2.5 | V   |
|                 |                     | <b>Quercion farnetto et Orno-Cotinetalia</b>  |     |      |      |      |     |     |
| H               | Md                  | <i>Potentilla micrantha</i>   | +   | .    | +    | +    | +   | IV  |
| H               | Eua                 | <i>Silene viridiflora</i>   | +   | .    | +    | .    | .   | II  |
|                 |                     | <b>Quercetalia petraeae-pubescentis</b>   |     |      |      |      |     |     |
| H               | Ct                  | <i>Fragaria viridis</i>   | +   | +    | +    | + .5 | .   | IV  |
| H               | Eua                 | <i>Hypericum perforatum</i>   | +   | +    | .    | +    | .   | III |
| H               | Ct                  | <i>Viscaria vulgaris</i>  | .   | .    | +    | +    | +   | II  |
| H               | Eua                 | <i>Trifolium medium</i>   | .   | .    | +    | .    | +   | II  |
| Th              | Md                  | <i>Sedum cepaea</i>   | +   | .    | +    | .    | .   | II  |
| H               | Eua                 | <i>Carex montana</i>  | .   | + .5 | .    | +    | .   | II  |
|                 |                     | <b>Quercetum pubescenti-petraeae</b>  |     |      |      |      |     |     |
| MM              | E                   | <i>Quercus petraea</i>  | .   | .    | +    | .    | +   | II  |
| M               | E                   | <i>Crataegus monogyna</i>   | +   | .    | +    | +    | +   | IV  |
| M               | E                   | <i>Pyrus pyraeaster</i>   | +   | .    | .    | .    | +   | II  |
| M               | Ec                  | <i>Sorbus torminalis</i>  | .   | +    | .    | .    | +   | II  |
| M               | Eua                 | <i>Rosa canina</i>  | .   | .    | +    | .    | +   | II  |
| H-N             | E                   | <i>Genista tinctoria</i>  | 2.5 | 1.5  | 2.5  | 1.5  | 2.5 | V   |
| H               | Cp                  | <i>Poa angustifolia</i>   | 1.5 | 2.5  | +    | + .5 | +   | V   |
| Ch              | Cp                  | <i>Veronica officinalis</i>   | +   | +    | + .4 | +    | +   | V   |
| H               | Eua                 | <i>Veronica chamaedrys</i>  | +   | +    | +    | +    | +   | V   |
| H               | Cp                  | <i>Calamintha vulgaris</i>  | +   | +    | +    | +    | +   | V   |
| H               | Eua                 | <i>Galium verum</i>   | +   | +    | .    | 1.3  | +   | IV  |
| H               | Md                  | <i>Hieracium racemosum</i>  | +   | +    | .    | .    | +   | III |
| H               | Ct                  | <i>Hieracium bauhinii</i>   | +   | +    | .    | .    | .   | II  |
| H               | Cp                  | <i>Poa nemoralis</i>  | .   | 1.3  | .    | .    | .   | I   |
| H               | Eua                 | <i>Astragalus glycyphyllos</i>  | +   | .    | .    | .    | .   | I   |
| H               | Eua                 | <i>Galium mollugo</i>   | .   | .    | .    | +    | .   | I   |
|                 |                     | <b>Însoțitoare</b>  |     |      |      |      |     |     |
| H               | Eua                 | <i>Anthoxanthum odoratum</i>  | +   | +    | 1.5  | +    | +   | V   |
| Ch              | E                   | <i>Lysimachia nummularia</i>  | +   | +    | +    | +    | 1.3 | V   |
| H               | P- Md               | <i>Lysimachia punctata</i>  | +   | +    | +    | +    | +   | V   |
| H               | E                   | <i>Hieracium maculatum</i>  | +   | +    | +    | +    | +   | V   |
| H               | Eua                 | <i>Luzula pilosa</i>  | +   | +    | +    | +    | +   | V   |
| H               | Ec                  | <i>Viola silvestris</i>   | +   | +    | +    | +    | +   | IV  |
| TH              | Eua                 | <i>Campanula patula</i>   | .   | +    | +    | +    | +   | IV  |
| H               | Cm                  | <i>Prunella vulgaris</i>  | .   | +    | +    | .    | +   | III |

Tabelul nr. 1 (continuare)

| Forma biologică | Elementul floristic | Nr. ridicării<br>Altitudinea (m s.m.) | 1   | 2   | 3    | 4   | 5   | K   |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|                 |                     |                                       | 350 | 350 | 340  | 340 | 350 |     |
|                 |                     | Expoziția                             | —   | —   | S    | S   | —   |     |
|                 |                     | Înclinația (grade)                    | —   | —   | 3    | 5   | —   |     |
|                 |                     | Înălțimea arborilor (m)               | 13  | 14  | 12   | 15  | 15  |     |
|                 |                     | Închegarea coronamen-<br>tului        | 07  | 08  | 07   | 08  | 08  |     |
|                 |                     | Acoperirea stratului ier-<br>bos (%)  | 20  | 25  | 25   | 20  | 10  |     |
|                 |                     | Acoperirea litierei (%)               | 65  | 50  | 60   | 80  | 50  |     |
|                 |                     | Suprafața analizată (m²)              | 400 | 400 | 400  | 400 | 400 |     |
| H               | Eua                 | <i>Potentilla erecta</i>              | .   | +   | + .5 | +   | .   | III |
| H               | E                   | <i>Rubus caesius</i>                  | +   | +   | .    | +   | .   | III |
| H               | Ec                  | <i>Festuca heterophylla</i>           | .   | .   | 1.5  | +   | +   | III |
| H               | E                   | <i>Ajuga reptans</i>                  | .   | .   | + .3 | +   | +   | III |
| H               | Eua                 | <i>Hieracium cymosum</i>              | +   | +   | +    | .   | .   | III |
| H               | Cm                  | <i>Cerastium caespitosum</i>          | +   | .   | .    | .   | +   | II  |
| H               | Eua                 | <i>Achillea millefolium</i>           | +   | .   | +    | .   | .   | II  |
| H               | E                   | <i>Betonica officinalis</i>           | .   | +   | +    | .   | .   | II  |
| H               | Eua                 | <i>Myosotis silvatica</i>             | .   | .   | +    | .   | +   | II  |
| G               | Eua                 | <i>Platanthera bifolia</i>            | .   | .   | +    | +   | .   | II  |
| H               | E                   | <i>Poa compressa</i>                  | +   | .   | +    | .   | .   | II  |
| Th              | Ec                  | <i>Dianthus armeria</i>               | +   | .   | .    | .   | .   | I   |
| H               | Eua                 | <i>Glechoma hederacea</i>             | +   | .   | .    | .   | .   | I   |
| H               | Eua                 | <i>Leontodon danubialis</i>           | .   | +   | .    | .   | .   | I   |
| Th              | Bd                  | <i>Melampyrum bihariense</i>          | .   | +   | .    | .   | .   | I   |
| H               | Cp                  | <i>Carex pallescens</i>               | .   | .   | +    | .   | .   | I   |
| H               | Cm                  | <i>Plantago lanceolata</i>            | .   | .   | +    | .   | .   | I   |
| M               | Ec                  | <i>Carpinus betulus</i>               | .   | .   | +    | .   | .   | I   |
| H               | Cp                  | <i>Juncus effusus</i>                 | .   | .   | .    | .   | +   | I   |
| H               | Eua                 | <i>Scrophularia nodosa</i>            | .   | .   | .    | .   | +   | I   |
| Ch-N            | B                   | <i>Genista ovata</i>                  | .   | +   | .    | .   | .   | I   |
| H               | Eua                 | <i>Brachypodium silvaticum</i>        | +   | .   | .    | .   | .   | I   |

Releveele 1 și 2 = Culmea Bistra (Cuișed), 9.VI.1968.  
3-5 = Culmea Bistra (Cuișed), 30.V.1969.

pentru aceste gorunete acidofile și s-o încadrăm în această alianță. În spectrul floristic alături de elementul nordic care predomină (73%) este bine reprezentat și cel mediteranean (16,6%). În spectrul biologic predomină hemicriptofitele (70,8%) și terofitele (12,6%).

Spectrul floristic: Eua = 33,3%; E = 16,7%; Ec = 10,4%;

Md = 16,6%; Cp = 12,6%; Ct = 8,3%; Adv = 2,1%.

Spectrul biologic: MM = 4,2%; N = 2%; H = 70,8%;

Th = 12,6%; Ch = 4,2%; G = 2%; E = 2%.

3. *Genisto (tinctoriae) — Quercetum petraeae* Klika 1932 transsilvanicum Gergely 1962 (tabelul nr. 3). Cenozele acestei asociații apar frecvent în zona piemontană nord-vestică a Munților Plopiș, pe platouri și pante cu înclinare mică-mijlocie (Dealul Mărului, Dealul Blidărița ș.a.). Vegetează pe soluri silvestre podzolice gălbui și brun gălbui acide de profunzime, cu reacția slab acidă (pH 5,9) și un conținut mijlociu în humus (4,9%).

Tabelul nr. 2

Cytiso-Quercetum Paucă 1941

| Forma biologică | Elementul floristic | Nr. ridicării<br>Altitudinea (m s.m.)                         | 1    | 2    | 3    | 4   | 5   | 6    | 7    | 8    | K   |
|-----------------|---------------------|---|------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|
|                 |                     |   | 350  | 420  | 610  | 590 | 450 | 540  | 320  | 520  |     |
|                 |                     | Expoziția   | E    | E    | S    | S   | SV  | S    | S    | V    |     |
|                 |                     | Înclinația (grade)  | 20   | 25   | 30   | 25  | 20  | 40   | 25   | 20   |     |
|                 |                     | Înălțimea arborilor (m)                                       | 12   | 14   | 10   | 20  | 10  | 12   | 15   | 18   |     |
|                 |                     | Închegarea coronamen-<br>tului                                | 07   | 07   | 06   | 08  | 06  | 07   | 07   | 07   |     |
|                 |                     | Acoperirea stratului ier-<br>bos (%)                          | 15   | 20   | 15   | 30  | 25  | 25   | 5    | 30   |     |
|                 |                     | Acoperirea litierei (%)                                       | 40   | 70   | 80   | 30  | 60  | 50   | 30   | 75   |     |
|                 |                     | Suprafața analizată (m²)                                      | 400  | 400  | 400  | 400 | 400 | 400  | 400  | 400  |     |
|                 |                     | Char. ass.  |      |      |      |     |     |      |      |      |     |
| MM              | E                   | <i>Quercus petraea</i>  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 4.5 | 3.5 | 4.5  | 4.5  | 4.5  | V   |
| N               | Ec                  | <i>Cytisus nigricans</i>                                      | 1.3  | 2.5  | + .3 | 1.5 | 3.5 | 1.5  | 1.5  | + .5 | V   |
|                 |                     | D. ass.   |      |      |      |     |     |      |      |      |     |
| H               | E                   | <i>Luzula luzuloides</i>                                      | 1.5  | 1.5  | 2.5  | 2.5 | 1.5 | 1.5  | + .5 | 1.5  | V   |
| H               | Cp                  | <i>Deschampsia flexuosa</i>                                   | 1.5  | 1.3  | 1.5  | 2.5 | 1.5 | 2.5  | 1.5  | 2.5  | V   |
| Brch            | Cp                  | <i>Dicranum scoparium</i>                                     | +    | 2.5  | .    | 2.5 | 2.5 | .    | .    | 1.5  | III |
|                 |                     | Quercetum petraeae et<br>Quercetalia petraeae-<br>pubescentis |      |      |      |     |     |      |      |      |     |
| H               | Ct                  | <i>Viscaria vulgaris</i>                                      | .    | +    | + .3 | +   | +   | + .3 | .    | .    | III |
| H               | Eua                 | <i>Hypericum perforatum</i>                                   | .    | .    | +    | .   | +   | .    | + .3 | +    | III |
| H               | Ct                  | <i>Fragaria viridis</i>                                       | .    | +    | .    | .   | +   | .    | .    | +    | II  |
| H               | Eua                 | <i>Trifolium medium</i>                                       | .    | +    | +    | .   | .   | .    | .    | .    | I   |
| H               | Md                  | <i>D. Potentilla mierantha</i>                                | .    | .    | .    | .   | .   | .    | +    | + .3 | I   |
| Th              | Md                  | <i>Sedum cepaea</i>   | .    | .    | .    | .   | .   | .    | + .5 | .    | I   |
|                 |                     | Quercetum pubescenti-<br>petraeae                             |      |      |      |     |     |      |      |      |     |
| H-N             | E                   | <i>Genista tinctoria</i>                                      | .    | + .3 | +    | +   | +   | .    | + .5 | + .5 | IV  |
| Ch              | Cp                  | <i>Veronica officinalis</i>                                   | + .5 | +    | +    | +   | +   | +    | + .3 | + .3 | V   |
| H               | Cp                  | <i>Poa nemoralis</i>  | .    | +    | + .5 | +   | +   | +    | +    | 1.3  | IV  |
| H               | Eua                 | <i>Campanula persicifolia</i>                                 | .    | +    | +    | +   | +   | +    | +    | .    | IV  |
| H               | Md                  | <i>Hieracium racemosum</i>                                    | +    | .    | .    | .   | +   | +    | +    | +    | III |
| H               | Eua                 | <i>Galium mollugo</i>   | +    | +    | .    | .   | +   | .    | +    | +    | II  |
| H               | Cp                  | <i>Calamintha vulgaris</i>                                    | .    | .    | +    | .   | .   | .    | .    | +    | I   |
| H               | E                   | <i>Melica uniflora</i>  | .    | .    | .    | +   | .   | .    | .    | +    | I   |
| H               | Md                  | <i>Symphytum tuberosum</i>                                    | .    | .    | +    | .   | .   | .    | +    | .    | I   |
| H               | E                   | <i>Digitalis grandiflora</i>                                  | .    | .    | .    | .   | .   | +    | .    | .    | I   |
| H               | Ct                  | <i>Inula salicina</i>   | .    | .    | .    | .   | .   | +    | .    | .    | I   |
| Th              | Ec                  | <i>Cardaminopsis arenosa</i>                                  | .    | .    | +    | .   | .   | .    | .    | .    | I   |
|                 |                     | Fagetalia   |      |      |      |     |     |      |      |      |     |
| MM-M            | Ec                  | <i>Fagus silvatica</i>  | .    | .    | .    | .   | +   | 1.3  | +    | .    | II  |
| H               | Eua                 | <i>Galium vernum</i>  | +    | .    | .    | +   | .   | +    | +    | +    | III |
| G               | Eua                 | <i>Platanthera bifolia</i>                                    | .    | .    | +    | .   | +   | .    | .    | +    | II  |
| H               | Md                  | <i>D. Festuca drymeia</i>                                     | .    | .    | .    | +   | .   | .    | +    | +    | II  |
| H               | Eua                 | <i>Epilobium montanum</i>                                     | +    | .    | .    | .   | .   | .    | .    | +    | I   |
| H               | Ec                  | <i>Galium schultesii</i>                                      | .    | .    | + .3 | .   | .   | .    | .    | .    | I   |
| H               | Eua                 | <i>Campanula trachelium</i>                                   | .    | .    | +    | .   | .   | .    | .    | .    | I   |

Tabelul nr. 2 (continuare)

| Forma biologică | Elementul floristic | Nr. ridicării                            | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | K   |
|-----------------|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                 |                     | Altitudinea (m s. m.)                    | 350 | 420 | 610 | 590 | 450 | 540 | 320 | 520 |     |
|                 |                     | Expoziția                                | E   | E   | S   | S   | SV  | S   | S   | V   |     |
|                 |                     | Înclinarea (grade)                       | 20  | 25  | 30  | 25  | 20  | 40  | 25  | 20  |     |
|                 |                     | Înălțimea arborilor (m)                  | 12  | 14  | 10  | 20  | 10  | 12  | 15  | 18  |     |
|                 |                     | Închegarea corone-<br>mentului           | 07  | 07  | 06  | 08  | 06  | 07  | 07  | 07  |     |
|                 |                     | Acoperirea stratului<br>ierbos (%)       | 15  | 20  | 15  | 30  | 25  | 25  | 5   | 30  |     |
|                 |                     | Acoperirea litierei (%)                  | 40  | 70  | 80  | 30  | 60  | 50  | 30  | 75  |     |
|                 |                     | Suprafața analizată<br>(m <sup>2</sup> ) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |     |
|                 |                     | Însoțitoare                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| H               | E                   | <i>Hieracium pilosella</i>               | +   | +   | +   | +   | +   | .   | +   | +   | IV  |
| H               | E                   | <i>Hieracium maculatum</i>               | +   | +   | .   | .   | +   | .   | .   | +   | II  |
| H               | Ec                  | <i>Hieracium sabaudum</i>                | +   | +   | +   | .   | .   | .   | .   | +   | II  |
| Th              | Md                  | <i>Vulpia myuros</i>                     | 2.3 | +   | +   | .   | .   | .   | .   | .   | II  |
| H               | E                   | <i>Poa compressa</i>                     | +   | .   | +   | .   | +   | .   | .   | .   | II  |
| H               | Eua                 | <i>Anthoxanthum odora-<br/>tum</i>       | +   | .   | .   | .   | .   | +   | .   | .   | I   |
| H               | Eua                 | <i>Hieracium murorum</i>                 | +   | +   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | I   |
| Th              | Atl-Md              | <i>Hypericum humifusum</i>               | +   | +   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | I   |
| H               | Cp                  | <i>Agrostis tenuis</i>                   | +   | +   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | I   |
| E               | Md                  | <i>Loranthus europaeus</i>               | +   | +   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | I   |
| Breh            | Cp                  | <i>Polytrichum formosum</i>              | 2.5 | 2.5 | .   | +   | 2.5 | .   | .   | +   | III |
| Brr             | Cm                  | <i>Hypnum cupressiforme</i>              | +   | .   | .   | .   | .   | .   | +   | +   | II  |
| Breh            | Cp                  | <i>Atricum undulatum</i>                 | .   | .   | .   | +   | .   | +   | .   | .   | I   |

Specii găsite într-un singur relevu: H Cp *Gnaphalium silvaticum* 1: +, Th Eua *Trifolium arvense* 1: +, Ch Ct *Thymus glabrescens* 1: +, H Eua *Achillea millefolium* 1: +, H Eua *Poa bulbosa* 1: +, Th Adv *Stenactis ramosa* 1: +, H Eua *Stellaria holostea* 2: +, H Eua *Betula pendula* 3: +, H Eua *Hieracium cymosum* 3: +.

Relevu 1 = Dealul Gorunet (com. Hălmașd), 23.VII.1969.

Relevu 2 = Dealul Cupari (sat Cerișa), 23.VII.1969.

Releveele 3 și 4 = Dealul Runcului, 2.VII.1969.

Relevu 5 = Dealul Măgurița, 29.IV.1969.

Relevu 6 = Pădurea Neagră, 28.VI.1969.

Relevu 7 = Culmea Derna, 27.VI.1969.

Relevu 8 = Dealul Popur (valea Borumlaca), 24.VII.1969.

Stratul arborescent este bine dezvoltat și are o închegare a corone-mentului de 0,8. Gorunul este principalul edificator al acestui strat, pe alocuri fiind însoțit de *Carpinus betulus*, *Quercus cerris* și *Tilia platyphyllos*. Stratul arbustiv este slab dezvoltat. Numărul ridicat de specii care formează stratul ierbos, printre care sînt prezente și unele indica-toare de mull (*Carex pilosa*, *Euphorbia amygdaloides*, *Dactylis polygama*), precum și o mai slabă reprezentare a speciilor acidofile în compoziția floristică a acestor cenoze relevă deosebiri semnificative față de asociația *Cytiso-Quercetum*, respectiv *Luzulo-Quercetum petraeae* (8), (14), fapt pentru care menținem aceste cenoze într-o asociație independentă (4), (5), (6).

Tabelul nr. 3

Genisto (tinctoriae) — Quercetum petraeae Klika 1932

| Forma biologică | Elementul floristic | Nr. ridicării   | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | K   |
|-----------------|---------------------|---|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
|                 |                     | Altitudinea (m s.m.)  | 320 | 340  | 360  | 430  | 280  | 300  | 500  |     |
|                 |                     | Expoziția   | SE  | S    | SV   | S    | E    | SV   | ES   |     |
|                 |                     | Înclinarea (grade)  | 20  | 10   | 5    | 10   | 15   | 5    | 15   |     |
|                 |                     | Înălțimea arborilor (m)   | 14  | 16   | 16   | 15   | 15   | 12   | 12   |     |
|                 |                     | Închegarea coronamentu-<br>lui                                  | 08  | 08   | 08   | 08   | 08   | 08   | 07   |     |
|                 |                     | Acoperirea stratului ierbos<br>(%)                              | 20  | 20   | 25   | 40   | 35   | 10   | 15   |     |
|                 |                     | Acoperirea litierei (%)   | 75  | 75   | 80   | 70   | 80   | 75   | 80   |     |
|                 |                     | Suprafața analizată (m <sup>2</sup> )                           | 400 | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |     |
|                 |                     | Char. ass.  |     |      |      |      |      |      |      |     |
| MM              | E                   | <i>Quercus petraea</i>  | 5.5 | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 5.5  | V   |
| H-N             | E                   | <i>Genista tinctoria</i>  | 1.5 | 1.5  | + .5 | 2.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | V   |
|                 |                     | D. reg.   |     |      |      |      |      |      |      |     |
| H               | Md                  | <i>Festuca drymeia</i>  | +   | +    | 2.5  | +    | + .3 | +    | .    | IV  |
| H               | Md                  | <i>Potentilla micrantha</i>                                     | .   | + .5 | +    | +    | +    | + .5 | +    | IV  |
| H               | B                   | <i>Lathyrus hallersteinii</i>                                   | .   | .    | .    | +    | +    | .    | .    | I   |
| Ch              | Md                  | <i>Ruscus hypoglossum</i>                                       | .   | .    | .    | .    | +    | .    | .    | I   |
| H               | Md                  | <i>Arenonia agrimonoides</i>                                    | .   | .    | .    | .    | +    | .    | .    | I   |
|                 |                     | Quercion petraeae et Quer-<br>cetalia petraeae-pubes-<br>centis |     |      |      |      |      |      |      |     |
| MM              | Md                  | <i>Quercus cerris</i>   | +   | .    | .    | .    | .    | +    | .    | I   |
| N               | Ec                  | <i>Cytisus nigricans</i>  | 1.4 | +    | + .3 | +    | .    | +    | +    | IV  |
| H               | Ec                  | <i>Lathyrus niger</i>   | +   | +    | +    | +    | +    | +    | +    | IV  |
| H               | Ct                  | <i>Fragaria viridis</i>   | +   | +    | +    | +    | +    | +    | +    | V   |
| H               | Eua                 | <i>Trifolium medium</i>   | .   | +    | +    | +    | 1.5  | +    | +    | IV  |
| H               | Ct                  | <i>Viscaria vulgaris</i>  | +   | .    | .    | .    | .    | +    | +    | II  |
| H               | Eua                 | <i>Carex montana</i>  | .   | .    | .    | + .3 | .    | +    | .    | I   |
| H               | Eua                 | <i>Hypericum perforatum</i>                                     | .   | +    | .    | +    | .    | .    | .    | I   |
| H               | Eua                 | <i>Galium cruciata</i>  | .   | .    | .    | .    | +    | .    | .    | I   |
|                 |                     | Quercetia pubescenti-pe-<br>traeae                              |     |      |      |      |      |      |      |     |
| M               | Eua                 | <i>Crataegus monogyna</i>                                       | +   | +    | .    | +    | +    | .    | +    | III |
| M               | Eua                 | <i>Rosa canina</i>  | +   | +    | .    | .    | .    | +    | .    | II  |
| M               | E                   | <i>Pyrus pyraeaster</i>   | .   | +    | .    | .    | .    | +    | .    | I   |
| H               | Eua                 | <i>Cynanchum vincetoxicum</i>                                   | .   | +    | .    | .    | .    | .    | .    | I   |
| H               | Cp                  | <i>Poa nemoralis</i>  | 2.5 | 2.5  | 2.5  | +    | 2.5  | 1.5  | 2.5  | V   |
| H               | Cp                  | <i>Calamintha vulgaris</i>                                      | +   | +    | +    | +    | +    | +    | +    | V   |
| H               | Md                  | <i>Hieracium racemosum</i>                                      | +   | +    | +    | +    | +    | .    | +    | IV  |
| Ch              | Cp                  | <i>Veronica officinalis</i>                                     | +   | +    | +    | + .3 | +    | .    | +    | IV  |
| H               | Eua                 | <i>Veronica chamaedrys</i>                                      | +   | +    | +    | .    | +    | .    | +    | III |
| H               | Md                  | <i>Symphytum tuberosum</i>                                      | .   | +    | +    | .    | +    | .    | +    | III |
| H               | Eua                 | <i>Astragalus glycyphyllos</i>                                  | +   | .    | +    | +    | +    | .    | + .3 | III |
| H               | Eua                 | <i>Silene nutans</i>  | +   | .    | .    | +    | +    | +    | +    | III |
| H               | Eua                 | <i>Campanula persicifolia</i>                                   | +   | .    | .    | +    | +    | +    | +    | III |
| H               | E                   | <i>Melica uniflora</i>  | .   | +    | .    | .    | 1.5  | +    | .    | II  |
| H               | Eua                 | <i>Sedum maximum</i>  | .   | .    | .    | +    | .    | .    | .    | I   |
|                 |                     | Fagetalia (s.l.)  |     |      |      |      |      |      |      |     |
| MM              | Ec                  | <i>Tilia platyphyllos</i>                                       | .   | .    | .    | +    | +    | .    | .    | I   |
| H               | Eua                 | <i>Galium verum</i>   | +   | 1.5  | + .5 | 1.5  | 1.5  | 1.5  | +    | V   |
| H               | E                   | <i>Luzula luzuloides</i>  | 1.5 | + .3 | + .5 | 1.3  | +    | .    | +    | IV  |



Tabelul nr. 3 (continuare)

| Forma biologică | Elementul floristic | Nr. ridicării                   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | K   |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                 |                     | Altitudinea (m s.m.)            | 320 | 340 | 360 | 430 | 280 | 300 | 500 |     |
|                 |                     | Expoziția                       | SE  | S   | SV  | S   | E   | SV  | ES  |     |
|                 |                     | Înclinarea (grade)              | 20  | 10  | 5   | 10  | 15  | 5   | 15  |     |
|                 |                     | Înălțimea arborilor (m)         | 14  | 16  | 16  | 15  | 15  | 12  | 12  |     |
|                 |                     | Închegarea coronamentului       | 08  | 08  | 08  | 08  | 08  | 08  | 07  |     |
|                 |                     | Acoperirea stratului ierbos (%) | 20  | 20  | 25  | 40  | 35  | 10  | 15  |     |
|                 |                     | Acoperirea litierei (%)         | 75  | 75  | 80  | 70  | 80  | 75  | 80  |     |
|                 |                     | Suprafața analizată (m²)        | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |     |
| H               | Ec                  | <i>Galium schultesii</i>        | +   | +   | .   | .   | +   | +   | +   | III |
| H               | Ec                  | <i>Dactylis polygama</i>        | .   | .   | +   | .   | +   | +   | +   | III |
| Ch              | Ec                  | <i>Euphorbia amygdaloides</i>   | .   | +   | +   | +   | +   | +   | .   | III |
| G               | Eua                 | <i>Cephalanthera damasonium</i> | +   | +   | +   | .   | .   | .   | +   | III |
| H               | E                   | <i>Dentaria bulbifera</i>       | .   | +.5 | +   | .   | +   | .   | .   | II  |
| H               | Eua                 | <i>Luzula pilosa</i>            | .   | .   | +   | .   | +   | .   | .   | I   |
| H               | E                   | <i>Ajuga reptans</i>            | .   | .   | +   | .   | +   | .   | .   | I   |
| H               | Eua                 | <i>Campanula trachelium</i>     | .   | +   | .   | .   | +   | .   | +   | II  |
| H               | Ec                  | <i>Viola silvestris</i>         | .   | +   | .   | .   | .   | +   | .   | I   |
| G               | Eua                 | <i>Neottia nidus-avis</i>       | .   | +   | .   | .   | +   | .   | .   | I   |
| H               | Eua                 | <i>Lathyrus vernus</i>          | .   | .   | .   | .   | +   | .   | .   | I   |
| H               | E                   | <i>Mycelis muralis</i>          | .   | .   | .   | .   | +   | +   | .   | I   |
| H               | Ec                  | <i>Festuca heterophylla</i>     | .   | .   | .   | .   | .   | +.3 | +   | I   |
|                 |                     | <b>Carpinion</b>                |     |     |     |     |     |     |     |     |
| MM-M            | Ec                  | <i>Carpinus betulus</i>         | +   | .   | +   | +   | .   | 1.5 | +   | III |
| M               | Eua                 | <i>Cerasus avium</i>            | +   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | I   |
| H               | Eua                 | <i>Carex pilosa</i>             | +   | +   | +   | .   | +   | +   | .   | III |
| H               | Eua                 | <i>Stellaria holostea</i>       | +   | +   | +   | .   | +   | +   | .   | III |
|                 |                     | <b>Însoțitoare</b>              |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Th              | Md                  | <i>Vulpia myuros</i>            | .   | .   | .   | 2.5 | .   | +   | .   | I   |
| H               | Eua                 | <i>Hieracium cymosum</i>        | .   | .   | .   | +   | .   | +   | .   | I   |
| H               | E                   | <i>Hieracium maculatum</i>      | .   | .   | .   | +   | .   | .   | +   | I   |
| H               | P-Md                | <i>Lysimachia punctata</i>      | .   | +   | .   | .   | .   | +   | .   | I   |

Specii găsite într-un singur releven: H Cp *Poa angustifolia* 1: +, M Md *Cornus mas* 2: +, H Eua *Lamium maculatum* 2: +, H Cp *Geum urbanum* 2: +, H E *Aposeris foetida* 2: +, H Cp *Poa pratensis* 3: +, M Ec *Fagus silvatica* 5: +, TH Eua *Campanula patula* 5: +, Th Eua *Moehringia trinervia* 6: +, H Eua *Anthoxanthum odoratum* 7: +, Th Md *Sedum cepaea* 7: +, H Ec *Pulmonaria officinalis* 7: +.

Releveul 1 = Dealul Lucaci, 28.V.1969.  
 Releveul 2 = Dealul Blidărița Mică, 28.V.1969.  
 Releveul 3 = Dealul Blidărița Mare, 28.V.1969.  
 Releveul 4 = Dealul Mărului, 27.V.1969.  
 Releveul 5 = Dealul Piciorul Torman, 30.V.1969.  
 Releveul 6 = Dealul Culmea Derna, 30.V.1969.  
 Releveul 7 = Dealul Liua, 28.VII.1969.

Prezența unor specii termofile (*Quercus cerris*, *Lathyrus hallersteini*, *Aremonia agrimonoides*, *Festuca drymeia*) în compoziția floristică a acestei asociații ne-a permis separarea variantei regionale descrisă de I. Gergely (5). În spectrul floristic al asociației elementul sudic este prezent în proporție de 16,4%.

Spectrul floristic: Eua = 38,9%; Ec = 16,4%; E = 14,9%;  
 Md = 16,4%; Cp = 8,9%; Ct = 3%; B = 1,5%.  
 Spectrul biologic: MM = 6%; M = 10,5%; H = 67,2%;  
 N = 3%; Ch = 4,4%; G = 3%; Th = 4,4%; TH = 1,5%.

## BIBLIOGRAFIE

1. BORZA AL. și BOȘCAIU N., *Introducere în studiul covorului vegetal*, București, 1965.
2. COLDEA GH., St. și cerc. biol., Seria botanică, 1970, 22, 1, 17–32.
3. — St. și cerc. biol., Seria botanică, 1971, 23, 5.
4. CSÜRÖS ST. RESMERIȚĂ I. și CSÜRÖS-KAPTALAN M., Contribuții botanice Cluj, 1969, 211–223.
5. GERGELY I., Contribuții botanice Cluj, 1962, 263–298.
6. — Contribuții botanice Cluj, 1968, 337–360.
7. JAKUCS P., *Die phytologischen Verhältnisse der Flaumeichen Buschwälder Südost-mittleuropas*, Budapest, 1961.
8. NEUHAUSL R. et NEUHAUSLOVA-NOVOTNA Z., Foia geobot. phytotax. (Praga), 1967, 2, 1, 1–42.
9. PAȘCOVSCHI S., *Succesiunea speciilor forestiere*, București, 1967.
10. PAȘCOVSCHI S. și LEANDRU V., *Tipuri de păduri din Republica Populară Română*, București, 1958.
11. PAUCĂ A., *Studii fitosociologice în Munții Codru și Muma*, București, 1941.
12. PĂUN M., Bul. št. Inst. agron. Craiova, 1965, 7, 61–97.
13. POP I., Contribuții botanice Cluj, 1967, 305–315.
14. Soó R., *Die regionalen Fagion-Verbanden und Gesellschaften Südosteuropas*, Budapest, 1964.
15. — Mitt. Ostalpin-Dinarischen Arbeitsgemeinschaft, 1967, 7, 119–122.

Centrul de cercetări biologice Cluj.

Primit în redacție la 11 ianuarie 1971.

## CONTRIBUȚIE LA CUNOAȘTEREA VEGETAȚIEI MASIVULUI CEHLĂU

DE  
V. ZANOSCHI

581.526 (498)

Jusqu'à présent la végétation du massif Ceahlău n'a pas été étudiée, étant exposée seulement sous forme d'esquisses générales. Burduja et collab. (1956) et Borhidi (1958) sont les seuls géobotanistes qui ont publié des données sur quelques associations identifiées d'après la méthode phytocénologique moderne. Dans cette note nous apportons une modeste contribution à la connaissance de la végétation du massif Ceahlău, en publiant des données sur 3 associations de prairie mésophylle qui n'ont pas été encore signalées dans ce massif.

În timp ce numeroasele explorări floristice începute acum 135 de ani și continuate aproape fără întrerupere pînă în zilele noastre au conturat în cea mai mare măsură inventarul plantelor vasculare din acest masiv, studiile privitoare la alcătuirea și distribuția grupărilor vegetale au rămas cu totul sporadice și incomplete. Vegetația Masivului Ceahlău a fost expusă pînă în prezent numai sub formă de schițe generale de D. Grecescu (1898, 1906), Z. Panțu (1915), I. Grințescu (9), (10), E. I. Nyárády (13). Singurii geobotaniști care publică pe bază de ridicări fitocenologice cîteva asociații din Ceahlău sînt C. Burduja și colaboratori (5) și A. Borhidi (1). Primul menționează (*l.c.*) asociația de *Festuca rubra*, cu un relevu, de pe valea Izvorul Muntelui, și asociația de *F. supina*, cu două relevee, de la Toaca și Lespezi, iar al doilea ne prezintă după metoda fitosociologică numai trei asociații care compun vegetația stîncăriilor, celelalte grupări vegetale menționate (*l.c.*) neavînd la bază analiza unor ridicări fitocenologice din teren.

În două note comunicate anterior și aflate sub tipar, am prezentat după metoda modernă de cercetare a vegetației 6 asociații higrofile și o asociație specifică masivelor calcaroase din lanțul carpatic împreună cu o subasociație nouă pentru știință.

Nota de față aduce o modestă contribuție la completarea cunoașterii vegetației Ceahlăului prin prezentarea a 3 asociații de pajiști mezofile, nesemnate încă din acest masiv.

**MOLINIO—JUNCETEA** Br.-Bl. 1947

**MOLINIETALIA** W. Koch 1926

**Agrostion albae** Soó 1933

**1. Festucetum pratensis** Soó 1938

**ARRHENATHERETEA** Br.-Bl. 1947

**ARRHENATHERETALIA** Pawl. 1928

**Arrhenatherion elatioris** (Br.-Bl. 1925) W. Koch 1926

**2. Arrhenatheretum elatioris** Br.-Bl. 1919

**Trisetum—Polygonion bistortae** Br.-Bl. 1947

**3. Trisetetum flavescens** (Stebler et Schröter) Brockm.-Jerosch 1907

**1. Festucetum pratensis** Soó 1938 (tabelul nr. 1)

**Răspîndire și ecologie.** Fitocenozele acestei asociații sînt răspîndite în toată țara, fiind semnalate de la șes pînă la munte.

Sub diferite variante geografice sau ecologice, această asociație se cunoaște în toată Europa centrală.

În regiunea studiată de noi, *Festucetum pratensis* este puțin răspîndită mai mult fragmentar, ocupînd locuri plane suficient de umede, pe terasele văilor sau pe culmile de la poalele masivului, la altitudini cuprinse între 525 și 685 m.

Am studiat fitocenozele acestei asociații pe Chica Baicului în apropiere de lacul Bicaz, pe terasa medie a pîrului Izvorul Alb, malul stîng al pîrului Secu, malul rîului Bicaz la Bicazu Ardelean, terasa superioară a rîului Bistra la est de Bicazu Ardelean.

**Structura.** Lista floristică însumează 85 de specii. Speciile constitutive reflectă cu fidelitate dominantă ecologică a stațiunii. Astfel din cele 85 de specii identificate, 60 sînt mezofite (70,20%). Mezo-higrofitele, higrofitele și higro-hidrofitele la un loc reprezintă 17,55%, mezo-xerofitele alcătuiesc 9,36 % iar xerofitele reprezintă abia 2,34%.

Specia dominantă și caracteristică — *Festuca pratensis* — este însoțită constant ( $K = V$ ) de *Trifolium pratense*, *Carum carvi*, *Rhinanthus minor*. Subconstant ( $K = IV$ ), la edificarea asociației participă *Poa trivialis*, *Bromus commutatus*, *Cynosurus cristatus*, *Prunella vulgaris*, *Chrysanthemum leucanthemum* ș.a.

**Spectrul biologic** este dominat de hemicriptofite cu 79,93% pe fondul cărora se evidențiază terofitele cu 11,7%, geofitele cu 6% și chamefitele cu numai 3%.

**Spectrul floristic:** Eua = 49,68%; E = 16,38%; Cp = 11,7%; Cosm = 10,53%; Ec = 7,02%; G = 2,34%; Alp = 1,17%; M = 1,17%.

Tabelul nr. 1  
*Festucetum pratensis* Soó 1938

| Forma biologică | Elementul floristic | Caracteristica | Numărul releveului                   | 1    | 2      | 3    | 4    | 5    | K   |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|------|--------|------|------|------|-----|
|                 |                     |                | Mărimea releveului (m <sup>2</sup> ) | 100  | 100    | 25   | 100  | 25   |     |
|                 |                     |                | Altitudinea (m)                      | 635  | 600    | 685  | 512  | 525  |     |
|                 |                     |                | Expoziția                            | plan | plan   | plan | plan | plan |     |
|                 |                     |                | Înclinația (grade)                   | —    | —      | —    | —    | —    |     |
|                 |                     |                | Acoperirea cu vegetație (%)          | 100  | 90—100 | 100  | 100  | 100  |     |
| H               | Eua                 | As             | <i>Festuca pratensis</i>             | 5,5  | 4,5    | 4,5  | 5,5  | 3,5  | V   |
| H               | Cosm                | Ord            | <i>Deschampsia caespitosa</i>        | —    | ++     | ++   | —    | —    | II  |
| H               | Eua                 | Ord            | <i>Lysimachia vulgaris</i>           | + 2  | —      | —    | + 1  | —    | II  |
| H               | Eua                 | Ord            | <i>Ranunculus repens</i>             | + 3  | —      | —    | —    | —    | I   |
| H               | Cosm                | Ord            | <i>Prunella vulgaris</i>             | + 1  | + 1    | + 3  | —    | ++   | IV  |
| H               | E                   | Ord            | <i>Carex flava</i>                   | —    | ++     | —    | —    | —    | I   |
| H               | E                   | Ord            | <i>Lychnis flos-cuculi</i>           | —    | —      | —    | ++   | —    | E   |
| H               | Eua                 | Cl             | <i>Potentilla reptans</i>            | —    | ++     | —    | —    | —    | I   |
| H               | Eua                 | Cl             | <i>Juncus inflexus</i>               | —    | —      | ++   | —    | —    | I   |
| H               | Cp                  | Cl             | <i>Juncus articulatus</i>            | —    | —      | ++   | —    | —    | I   |
| H               | Eua                 | In             | <i>Trifolium pratense</i>            | ++   | + 5    | + 3  | + 1  | 1,5  | V   |
| TH—H            | Eua                 | In             | <i>Carum carvi</i>                   | + 3  | + 2    | + 4  | + 1  | ++   | V   |
| Th              | E                   | In             | <i>Rhinanthus minor</i>              | ++   | ++     | ++   | ++   | ++   | V   |
| H               | Eua                 | In             | <i>Poa trivialis</i>                 | + 3  | + 2    | + 5  | 1,5  | —    | IV  |
| Th              | E                   | In             | <i>Bromus commutatus</i>             | ++   | —      | + 1  | + 2  | + 3  | IV  |
| H               | E                   | In             | <i>Cynosurus cristatus</i>           | —    | + 2    | + 2  | + 3  | ++   | IV  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Chrysanthemum leucanthemum</i>    | + 3  | + 5    | + 2  | ++   | —    | IV  |
| H               | Cp                  | In             | <i>Poa pratensis</i>                 | + 2  | —      | —    | ++   | 2,5  | III |
| H               | Eua                 | In             | <i>Dactylis glomerata</i>            | —    | 1,5    | ++   | —    | + 3  | III |
| H               | C                   | In             | <i>Trifolium montanum</i>            | ++   | ++     | —    | —    | ++   | III |
| H               | Eua                 | In             | <i>Lotus corniculatus</i>            | ++   | ++     | —    | —    | + 2  | III |
| H               | Eua                 | In             | <i>Trifolium repens</i>              | —    | —      | + 5  | + 2  | + 2  | III |
| H               | Eua                 | In             | <i>Taraxacum officinale</i>          | ++   | + 3    | —    | + 2  | —    | III |
| H               | Eua                 | In             | <i>Cichorium intybus</i>             | ++   | —      | ++   | —    | + 4  | III |
| TH              | E                   | In             | <i>Crepis biennis</i>                | —    | + 2    | ++   | —    | + 2  | III |
| H               | Eua                 | In             | <i>Ranunculus polyanthemus</i>       | —    | —      | ++   | ++   | ++   | III |
| H               | Eua                 | In             | <i>Filipendula hexapetala</i>        | —    | —      | + 1  | ++   | ++   | III |
| H               | Cp                  | In             | <i>Festuca rubra</i>                 | —    | + 4    | + 2  | —    | —    | II  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Anthoxanthum odoratum</i>         | —    | + 2    | 1,5  | —    | —    | II  |
| H               | Cp                  | In             | <i>Agrostis tenuis</i>               | —    | —      | —    | ++   | ++   | II  |
| Th—TH           | Eua                 | In             | <i>Medicago lupulina</i>             | —    | + 5    | + 3  | —    | —    | II  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Rumex crispus</i>                 | + 1  | —      | —    | + 1  | —    | II  |
| G               | Cosm                | In             | <i>Equisetum arvense</i>             | ++   | —      | 1,5  | —    | —    | II  |
| H               | Ec                  | In             | <i>Centaurea austriaca</i>           | —    | + 4    | +    | +    | —    | II  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Plantago lanceolata</i>           | —    | ++     | —    | —    | ++   | II  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Ranunculus acer</i>               | —    | ++     | —    | 1,5  | —    | II  |
| H               | Cosm                | In             | <i>Cerastium caespitosum</i>         | —    | + 1    | + 1  | —    | —    | II  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Hypericum maculatum</i>           | —    | ++     | —    | —    | + 1  | II  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Stellaria graminea</i>            | —    | —      | ++   | —    | ++   | II  |
| H               | E                   | In             | <i>Hypochoeris radicata</i>          | —    | —      | —    | ++   | ++   | II  |
| H               | Cosm                | In             | <i>Plantago major</i>                | —    | —      | —    | + 3  | ++   | I   |
| H               | Eua                 | In             | <i>Briza media</i>                   | —    | + 5    | —    | —    | —    | I   |
| H               | Eua                 | In             | <i>Brachypodium pinnatum</i>         | —    | ++     | —    | —    | —    | I   |

Tabelul nr. 1 (continuare)

| Forma biologică | Elementul floristic | Caracteristica | Numărul releveului                  | 1    | 2      | 3    | 4    | 5    | K |
|-----------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------|--------|------|------|------|---|
|                 |                     |                | Mărimea releveului(m <sup>2</sup> ) | 100  | 100    | 25   | 100  | 25   |   |
|                 |                     |                | Altitudinea (m)                     | 635  | 600    | 685  | 512  | 525  |   |
|                 |                     |                | Expoziția                           | plan | plan   | plan | plan | plan |   |
|                 |                     |                | Înclinația (grade)                  | —    | —      | —    | —    | —    |   |
|                 |                     |                | Acoperirea cu vegetație (%)         | 100  | 90-100 | 100  | 100  | 100  |   |
| H               | Eua                 | In             | <i>Holcus lanatus</i>               | —    | —      | —    | ++   | —    | I |
| H               | Cp                  | In             | <i>Phleum pratense</i>              | —    | —      | —    | ++   | —    | I |
| H               | Eua                 | In             | <i>Vicia cracca</i>                 | —    | ++     | —    | —    | —    | I |
| Ch              | C                   | In             | <i>Ononis hircina</i>               | —    | —      | ++   | —    | —    | I |
| H               | Eua                 | In             | <i>Lathyrus pratensis</i>           | —    | —      | ++   | —    | —    | I |
| Th—TH           | E                   | In             | <i>Trifolium campestre</i>          | —    | —      | —    | ++   | —    | I |
| H               | Ec                  | In             | <i>Trifolium alpestre</i>           | —    | —      | —    | —    | ++   | I |
| H               | Eua                 | In             | <i>Medicago falcata</i>             | —    | —      | —    | —    | ++   | I |
| H               | Cp                  | In             | <i>Scirpus silvaticus</i>           | + 1  | —      | —    | —    | —    | I |
| H               | Cosm                | In             | <i>Potentilla anserina</i>          | ++   | —      | —    | —    | —    | I |
| G               | Cosm                | In             | <i>Heleocharis palustris</i>        | ++   | —      | —    | —    | —    | I |
| G               | E                   | In             | <i>Colchium autumnale</i>           | —    | + 3    | —    | —    | —    | I |
| H               | Eua                 | In             | <i>Alchemilla vulgaris</i>          | —    | ++     | —    | —    | —    | I |
| Ch              | Ec                  | In             | <i>Helianthemum hirsutum</i>        | —    | ++     | —    | —    | —    | I |
| H               | Ec                  | In             | <i>Carlina acaulis</i>              | —    | ++     | —    | —    | —    | I |
| H               | Eua                 | In             | <i>Campanula glomerata</i>          | —    | ++     | —    | —    | —    | I |
| H               | Eua                 | In             | <i>Galium verum</i>                 | —    | + 1    | —    | —    | —    | I |
| G               | Cp                  | In             | <i>Ophioglossum vulgatum</i>        | —    | + 2    | —    | —    | —    | I |
| H               | Eua                 | In             | <i>Achillea millefolium</i>         | —    | + 2    | —    | —    | —    | I |
| H               | E                   | In             | <i>Leontodon danubialis</i>         | —    | + 3    | —    | —    | —    | I |
| H               | Ec                  | In             | <i>Thymus pulegioides</i>           | —    | + 1    | —    | —    | —    | I |
| H               | Eua                 | In             | <i>Carex distans</i>                | —    | —      | + 2  | —    | —    | I |
| H               | E                   | In             | <i>Carex hirta</i>                  | —    | —      | + 3  | —    | —    | I |
| Th              | E                   | In             | <i>Euphrasia rostkoviana</i>        | —    | —      | + 2  | —    | —    | I |
| H               | Cp                  | In             | <i>Carex pallescens</i>             | —    | —      | ++   | —    | —    | I |
| H               | Eua                 | In             | <i>Serratula tinctoria</i>          | —    | —      | —    | + 3  | —    | I |
| H               | Cp                  | In             | <i>Carex leporina</i>               | —    | —      | —    | + 3  | —    | I |
| H               | E                   | In             | <i>Betonica officinalis</i>         | —    | —      | —    | ++   | —    | I |
| H               | E                   | In             | <i>Prunella grandiflora</i>         | —    | —      | —    | ++   | —    | I |
| H               | Eua                 | In             | <i>Leontodon autumnalis</i>         | —    | —      | —    | ++   | —    | I |
| H—Hh            | Eua                 | In             | <i>Myosotis palustris</i>           | —    | —      | —    | ++   | —    | I |
| H               | Eua                 | In             | <i>Galium palustre</i>              | —    | —      | —    | ++   | —    | I |
| H               | Eua                 | In             | <i>Roripa silvestris</i>            | —    | —      | —    | ++   | —    | I |
| Th              | Cp                  | In             | <i>Polygonum hidropiper</i>         | —    | —      | —    | ++   | —    | I |
| G               | Eua                 | In             | <i>Cirsium arvense</i>              | —    | —      | —    | —    | ++   | I |
| H               | Cosm                | In             | <i>Rumex acetosella</i>             | —    | —      | —    | —    | ++   | I |
| H               | Alp                 | In             | <i>Myosotis alpestris</i>           | —    | —      | —    | —    | ++   | I |
| Th              | Cosm                | In             | <i>Capsella bursa-pastoris</i>      | —    | —      | —    | —    | ++   | I |
| TH              | E                   | In             | <i>Campanula patula</i>             | —    | —      | —    | —    | ++   | I |
| H               | Ec                  | In             | <i>Chrysanthemum corymbosum</i>     | —    | —      | —    | —    | ++   | I |
| H               | M                   | In             | <i>Asperula cynanchica</i>          | —    | —      | —    | —    | ++   | I |
| H               | Eua                 | In             | <i>Plantago media</i>               | —    | —      | —    | —    | ++   | I |

Localizarea releveelor: R<sub>1</sub>, terasa superioară a râului Bistra la est de Bicazu Ardelean; R<sub>2</sub>, malul râului Bicaz la Bicazu Ardelean; R<sub>3</sub>, malul stîng al pîrului Secu; R<sub>4</sub>, terasa medie a pîrului Izvorul Alb; R<sub>5</sub>, Chica Baicului.

Valoarea economică. Pajiștile edificate de *Festuca pratensis* sînt folosite ca fînă iar după cosire ca pășune. Din punct de vedere calitativ și cantitativ, valoarea acestor pajiști este ridicată grație unui număr mare de specii constitutive bune furajere, ca *Festuca pratensis*, *Poa pratensis*, *Dactylis glomerata*, *Festuca rubra*, *Agrostis tenuis*, *Phleum pratense*, *Lotus corniculatus*, *Trifolium pratense*, *Trifolium repens*, *Vicia cracca*, *Medicago falcata*, *Taraxacum officinale* etc.

Alături de valoarea furajeră ridicată menționăm că asociația se impune atenției prin numărul mare de specii medicinale (*Trifolium pratense*, *Rumex crispus*, *Potentilla anserina*, *Equisetum arvense*, *Taraxacum officinale*, *Cichorium intybus*, *Colchicum autumnale*, *Achillea millefolium* ș.a.) și melifere (*Lotus corniculatus*, *Medicago lupulina*, *Trifolium repens*, *Medicago falcata*, *Taraxacum officinale*, *Cichorium intybus* ș.a.).

Succesiunea. Prin reducerea umezelii din sol *Festucetum pratensis* poate evolua spre *F. rubrae* sau *Festuceto-Agrostidetum tenuis*, asociații cu care se învecinează pe teritoriul cercetat de noi.

## 2. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1919 (tabelul nr. 2)

Răspîndire și ecologie. *Arrhenatheretum elatioris* Br.-Bl. este o asociație larg răspîdită în luncile râurilor din Europa centrală. Pe teritoriul țării noastre a fost semnalată sub diferite variante (2), (3), (4), (6), (7), (8), (12), (14), (16), (17), (19), (20) (V. P a n a i t, 1969) ș.a.

În cuprinsul Ceahlăului, fitocenozele acestei asociații sînt cantonate prin livezile și grădinile de la poalele masivului, iar sporadic apar și pe coaste domoale cu expoziție S, SE. În toate cazurile se dezvoltă pe soluri fertile, reavene, bogate în substanțe organice. Fertilitatea solului este menținută de gospodarii locurilor prin gunoiri periodice. Cîteva fitocenoză ale acestei asociații au fost cercetate de noi, în lunca râului Bicaz la Bicazu Ardelean, pe Dealul Mărului la est de Bicazu Ardelean și pe lunca Bistrei în apropiere de pîrîul Caprei.

Structura și fizionomia. Lista floristică cuprinde 54 de specii. Specia caracteristică și edificatoare a asociației este *Arrhenatherum elatius*. Dintre caracteristicile clasei prezente în ridicările noastre amintim: *Dactylis glomerata*, *Trifolium pratense*, *Prunella vulgaris*, *Poa pratensis*, *Briza media*, *Festuca rubra*, *Carum carvi*, *Ranunculus acer*, *Plantago lanceolata*. Pentru ordin sînt caracteristice următoarele specii din releveele efectuate de noi: *Chrysanthemum leucanthemum*, *Taraxacum officinale*, *Lotus corniculatus*, *Medicago lupulina*, *Rhinanthus minor*, *Cerastium caespitosum*, *Achillea millefolium*, *Tragopogon orientalis*, *Cynosurus cristatus*, *Veronica chamaedrys*, *Heracleum sphondilium*. Pentru alianță sînt caracteristice: *Filipendula hexapetala*, *Campanula patula*. Restul speciilor sînt însoțitoare sau accidentale.

Acoperirea cu vegetație a pajiștilor edificate de *Arrhenatherum elatius* este foarte bună (90—100%).

Înălțimea vegetației oscilează între 1,10 și 1,25 m.

În fizionomia fitocenozelor putem distinge o stratificare destul de evidentă. Astfel, stratul superior uniform și dens este constituit din specii cu talie înaltă, ca *Arrhenatherum elatius*, *Trisetum flavescens*, *Dactylis glomerata*, *Centaurea austriaca*, *Cirsium oleraceum* ș.a.; stratul mijlociu este format din specii cu talie de 25—70 cm, ca *Chrysanthemum*

Tabelul nr. 2

Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1919

| Forma biologică | Elementul floristic | Caracteristica | Numărul releveului         |        |        |
|-----------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------|--------|
|                 |                     |                | 1                          | 2      | 3      |
|                 |                     |                | 100                        | 25     | 25     |
|                 |                     |                | Altitudinea (m)            | 690    | 600    |
|                 |                     |                | Expoziția                  | plan   | S, SE  |
|                 |                     |                | Înclinația (grade)         | —      | 1—5    |
|                 |                     |                | Acoperirea vegetației (%)  | 90—100 | 90—100 |
| H               | Eua                 | As             | Arrhenatherum elatius      | 4,5    | 3,5    |
| TH              | E                   | Al             | Campanula patula           | + 1    | + +    |
| H               | Eua                 | Al             | Filipendula hexapetala     | —      | + 3    |
| H               | Eua                 | Ord            | Chrysanthemum leucanthemum | + 5    | + 5    |
| H               | Eua                 | Ord            | Taraxacum officinale       | + 4    | + 3    |
| H               | Eua                 | Ord            | Lotus corniculatus         | + 2    | + 1    |
| Th—TH           | Eua                 | Ord            | Medicago lupulina          | + 1    | + 4    |
| Th              | E                   | Ord            | Rhinanthus minor           | + +    | —      |
| H               | Cosm                | Ord            | Cerastium caespitosum      | + +    | —      |
| H               | Eua                 | Ord            | Achillea millefolium       | + +    | + 5    |
| TH              | Eua                 | Ord            | Tragopogon orientalis      | —      | + +    |
| H               | E                   | Ord            | Cynosurus cristatus        | —      | + +    |
| H               | E                   | Ord            | Veronica chamaedrys        | —      | + 3    |
| TH—H            | Eua                 | Ord            | Heracleum sphondylium      | —      | + 5    |
| H               | Eua                 | Cl             | Dactylis glomerata         | 1,4    | + 5    |
| H               | Eua                 | Cl             | Trifolium pratense         | + 3    | —      |
| H               | Cosm                | Cl             | Prunella vulgaris          | + +    | + +    |
| H               | Cp                  | Cl             | Poa pratensis              | + +    | + +    |
| H               | Eua                 | Cl             | Briza media                | + +    | 1,5    |
| H               | Cp                  | Cl             | Festuca rubra              | —      | + 1    |
| H               | Eua                 | Cl             | Vicia cracca               | —      | + 2    |
| TH—H            | Eua                 | Cl             | Carum carvi                | —      | + 1    |
| H               | Eua                 | Cl             | Ranunculus acer            | —      | + 1    |
| H               | Eua                 | Cl             | Plantago lanceolata        | —      | + 1    |
| H               | Cp                  | In             | Trisetum flavescens        | 2,5    | —      |
| H               | M                   | In             | Onobrychis viciifolia      | + 5    | —      |
| H               | Eua                 | In             | Ranunculus polyanthemus    | + +    | —      |
| H               | Eua                 | In             | Medicago falcata           | + +    | 1,5    |
| H               | Eua                 | In             | Galium verum               | + +    | —      |
| H               | E                   | In             | Leontodon danubialis       | + +    | —      |
| H               | E                   | In             | Polygala vulgaris          | + 1    | —      |
| G               | E                   | In             | Colchicum autumnale        | + 2    | + 5    |
| Th              | E                   | In             | Bromus commutatus          | + +    | + 2    |
| H               | C                   | In             | Festuca sulcata            | + 3    | + 5    |
| H               | C                   | In             | Trifolium montanum         | + +    | —      |
| H               | E                   | In             | Primula elatior            | —      | + 2    |
| H               | Eua                 | In             | Campanula trachelium       | —      | + 1    |
| H               | Eua                 | In             | Alchemilla vulgaris        | —      | —      |
| Ch              | Ec                  | In             | Thymus pulegioides         | + +    | + 2    |
| H               | Eua                 | In             | Cichorium intybus          | + +    | —      |
| G               | Eua                 | In             | Cirsium arvense            | —      | + 3    |
| H—G             | Mp                  | In             | Ranunculus stevenii        | —      | + 2    |
| H               | Ec                  | In             | Centaurea austriaca        | + +    | —      |
| H               | C                   | In             | Salvia nemorosa            | + +    | —      |
| H               | Eua                 | In             | Plantago media             | + +    | + 2    |
| H               | Eua                 | In             | Trifolium repens           | —      | —      |

Tabelul nr. 2 (continuare)

| Forma biologică | Elementul floristic | Caracteristica | Numărul releveului        |        |        |
|-----------------|---------------------|----------------|---------------------------|--------|--------|
|                 |                     |                | 1                         | 2      | 3      |
|                 |                     |                | Mărimea releveului (m²)   | 100    | 25     |
|                 |                     |                | Altitudinea (m)           | 690    | 600    |
|                 |                     |                | Expoziția                 | plan   | S, SE  |
|                 |                     |                | Înclinația (grade)        | —      | 1—5    |
|                 |                     |                | Acoperirea vegetației (%) | 90—100 | 90—100 |
| Th              | Eua                 | In             | Rhinanthus glaber         | —      | + +    |
| H               | Ec                  | In             | Salvia verticillata       | —      | + +    |
| H               | Eua                 | In             | Campanula glomerata       | —      | + 2    |
| H               | Eua                 | In             | Galium verum              | —      | + 1    |
| H               | Eua                 | In             | Cirsium oleraceum         | —      | —      |
| TH—H            | C                   | In             | Bunias orientalis         | —      | + +    |
| Th              | Adv                 | In             | Matricharia chamomilla    | —      | + +    |
| TH—H            | Eua                 | In             | Melandrium album          | —      | + +    |

Localizarea releveelor: R<sub>1</sub>, terasa medie a râului Bicaz la Bicazu Ardelean; R<sub>2</sub>, Dealul Mărului la est de Bicazu Ardelean; R<sub>3</sub>, Lunca Bistrei în apropiere de piriul Caprei.

leucanthemum, Achillea millefolium, Carum carvi, Filipendula hexapetala, Festuca rubra ș.a.; stratul inferior cuprinde specii cu tulpini tiritoare sau de talie mică, ca Taraxacum officinale, Medicago lupulina, Galium verum, Prunella vulgaris, Trifolium repens ș.a.

Spectrul formelor biologice ne indică dominanța hemicriptofitelor (72,85%), urmate de terofite (19,91%), geofite (5,43%) și chamefite (1,81%).

Spectrul elementelor floristice: Eua = 54,75%; E = 18,1%; C = 7,24%; Cp = 5,43%; Ec = 5,43%; Cosm = 3,62%; M = 1,81%; Mp = 1,81%; Adv = 1,81%.

Importanța economică. Pajiștile de ovăzciior sînt folosite numai ca finături, fiind cosite, în funcție de troficitatea și umiditatea solului, de 2—3 ori pe an. Productivitatea acestor pajiști oscilează între 15 000 și 25 000 kg masă verde la ha, iar fitocenozele bine îngrășate pot asigura producții mult mai mari. Calitatea superioară a nutrețului obținut de pe aceste pajiști mărește importanța acestei asociații.

Succesiunea. Studiile întreprinse de cercetătorii români (6), (20) ca și de cei străini (Hortvatici, Issler, Libert ș.a.) au condus la concluzia că fitocenozele de Arrhenatheretum elatioris derivă din formațiuni higrofile.

Tipul higrofil concret din care descinde Arrhenatheretum elatioris este însă diferit la autorii citați. Astfel, I. Saffa (20) susține că această asociație derivă din formațiunea Carex—Eriophorum—Juncus, iar Șt. Csűrös (6) stabilește următoarea succesiune: formațiunea Scirpus silvaticus—Carex acutiformis—formațiunea Poa trivialis—Alopecurus pratensis—Festuca pratensis—asociația de Arrhenatheretum elatius.

Autorii străini citați consideră că această asociație ia naștere din pajiști higrofile dominate de *Carex vulpina*, *Holcus lanatus* sau din asociația *Deschampsietum caespitosae*.

Pe baza observațiilor noastre, *Arrhenatheretum elatioris* poate evolua fie în *Trisetetum flavescens*, o dată cu înrăutățirea condițiilor de umiditate și troficitate a solului, fie în *Festucetum pratensis*, o dată cu sporirea cantității de apă din sol.

### 3. *Trisetetum flavescens* (Stebler et Schröter) Brockm.-Jerosch 1907 (tabelul nr. 3)

**Răspîndire și ecologie.** Această asociație a fost menționată în România din finețele de la Tău, Oasa Mare, Prigoana, Cărbunaș la Laz (2); din valea Morii-Cluj (I. Pop și colaboratori, 1962); pe coastele muntelui Arșița (jud. Suceava), la Sinaia pe Cumpătu (jud. Prahova), la Rupea (jud. Sibiu), în județul Brașov (16); la Vălișoara din Depresiunea Trascăului (8); în pajiștea din Grădina botanică de la București (3); de la poalele Masivului Rarău (17); bazinul râului Moldovița (V. Panait, 1969) etc.

În regiunea cercetată de noi, *Trisetetum flavescens* se instalează pe solurile potrivit de umede, din văile largi, la baza masivului. Ridicările noastre au fost efectuate pe malul râului Bicaz la Bicazu Ardelean, în lunca Bistrițioarei la Poiana Grințieșului, la Gura Pintecului și pe pîrîul Suricu. Fitocenoze aparținînd acestei asociații au fost observate și în lungul pîrîului Izvorul Muntelui, dar pe suprafețe foarte mici.

**Structura.** Analizînd flora pajiștilor de *Trisetetum flavescens* pe baza a 7 relevee, constatăm că ele sînt constituite din 68 de specii mezofite (80,96%), 2 higrofită (2,38%), 2 mezo-higrofită (2,38%), 11 mezo-xerofite (13,09%) și 1 xerofită (1,19%).

Alături de speciile caracteristice — *Trisetum flavescens*, *Carum carvi*, *Agrostis tenuis* —, vegetează constant ( $K = V$ ) următoarele specii caracteristice pentru unitățile superioare asociației: *Dactylis glomerata*, *Chrysanthemum leucanthemum*, *Achillea millefolium*, *Trifolium pratense*, *Campanula patula*, *Prunella vulgaris*, *Taraxacum officinale*, *Cerastium caespitosum*, precum și mai multe specii subconstante ( $K = IV$ ), caracteristice pentru ordin sau clasă, ca *Medicago lupulina*, *Heracleum sphondilium*, *Tragopogon orientalis*, *Ranunculus acer* ș.a.

**Spectrul biologic:** H = 78,58%; T = 15,47%; Ch = 2,38%; G = 3,57%.

**Spectrul floristic** reflectă originea foarte diferită a speciilor din această asociație: Eua = 46,41%; E = 21,42%; Ec = 10,71%; C = 4,76%; Cosm = 5,95%; Cp = 4,80%; Alp = 2,38%; End = 1,19%; M = 1,19%; Mp = 1,19%.

**Importanța economică.** Pajiștile edificate de *Trisetum flavescens*, sînt valoroase din punct de vedere economic, atît prin producțiile mari la ha cît și prin conținutul ridicat în substanțe nutritive al speciilor participante la formarea acestor pajiști. Astfel datele din literatură arată că producția fitocenzozelor de *Trisetum flavescens* este cuprinsă între 13 900 și 20 000 kg masă verde la ha (16). Între speciile cu cea mai ridicată valoare furajeră, exprimată prin conținutul bogat în proteină brută, amin-

Tabelul nr. 3

*Trisetetum flavescens* (Stebler et Schröter) Brockm.-Jerosch 1907

| Forma biologică | Elementul floristic | Caracteristica | Numărul releveului                | 1          | 2   | 3   | 4   | 5   | 6          | 7          | K   |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|-----|
|                 |                     |                | Mărimea releveului (m²)           | 100        | 25  | 25  | 25  | 25  | 25         | 25         |     |
|                 |                     |                | Altitudinea (m)                   | 600        | 600 | 600 | 560 | 560 | 620        | 760        |     |
|                 |                     |                | Expoziția                         | p l a n    |     |     |     |     |            |            |     |
|                 |                     |                | Înclinația (grade)                | —          | —   | —   | —   | —   | —          | —          |     |
|                 |                     |                | Acoperirea vegetației (%)         | 90—<br>100 | 95  | 100 | 100 | 100 | 90—<br>100 | 90—<br>100 |     |
| H               | Cp                  | As             | <i>Trisetum flavescens</i>        | 5,5        | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5        | 4,5        | V   |
| TH--H           | Eua                 | As             | <i>Carum carvi</i>                | +1         | ++  | —   | +4  | +3  | —          | +5         | IV  |
| H               | Cp                  | As             | <i>Agrostis tenuis</i>            | —          | —   | —   | ++  | —   | —          | —          | I   |
| H               | Eua                 | Al             | <i>Alchemilla vulgaris</i>        | +1         | —   | —   | —   | ++  | —          | —          | II  |
| H               | Cosm                | Ord            | <i>Cerastium caespitosum</i>      | +3         | ++  | ++  | +1  | —   | ++         | ++         | V   |
| H               | Eua                 | Ord            | <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> | +5         | +5  | +5  | +3  | —   | ++         | 1,5        | V   |
| H               | Eua                 | Ord            | <i>Achillea millefolium</i>       | +2         | ++  | +1  | +3  | +1  | +3         | +5         | V   |
| TH              | E                   | Ord            | <i>Campanula patula</i>           | +1         | +3  | +1  | —   | ++  | ++         | ++         | V   |
| H               | Eua                 | Ord            | <i>Taraxacum officinale</i>       | +4         | +4  | +4  | +5  | 1,5 | +5         | 1,5        | V   |
| H               | Ec                  | Ord            | <i>Arrhenatherum elatius</i>      | —          | —   | +4  | —   | —   | —          | —          | I   |
| H               | E                   | Ord            | <i>Cynosurus cristatus</i>        | ++         | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | II  |
| H               | E                   | Ord            | <i>Knautia arvensis</i>           | +3         | —   | —   | —   | —   | —          | —          | I   |
| TH              | E                   | Ord            | <i>Crepis biennis</i>             | +4         | +3  | —   | —   | ++  | —          | —          | III |
| H               | Eua                 | Ord            | <i>Lotus corniculatus</i>         | +3         | —   | +2  | +2  | —   | —          | ++         | III |
| Th--TH          | Eua                 | Ord            | <i>Medicago lupulina</i>          | +2         | +2  | +1  | ++  | —   | —          | ++         | IV  |
| Th              | E                   | Ord            | <i>Rhinanthus minor</i>           | +2         | +3  | +1  | —   | —   | —          | —          | III |
| TH--H           | Eua                 | Ord            | <i>Heracleum sphondilium</i>      | ++         | ++  | —   | +2  | +1  | —          | ++         | IV  |
| TH              | Eua                 | Ord            | <i>Tragopogon orientalis</i>      | ++         | +1  | ++  | +2  | +1  | —          | —          | IV  |
| H               | Eua                 | Ord            | <i>Anthoxanthum odoratum</i>      | —          | +3  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |
| H               | Eua                 | Ord            | <i>Geranium pratense</i>          | —          | —   | —   | +3  | ++  | —          | —          | II  |
| H               | Cp                  | Cl             | <i>Festuca rubra</i>              | +1         | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | II  |
| H               | Eua                 | Cl             | <i>Dactylis glomerata</i>         | +5         | 1,5 | +4  | ++  | +5  | ++         | ++         | V   |
| H               | Eua                 | Cl             | <i>Festuca pratensis</i>          | ++         | +4  | —   | —   | —   | —          | —          | II  |
| H               | Cosm                | Cl             | <i>Rumex acetosa</i>              | +4         | ++  | —   | ++  | —   | +5         | —          | III |
| H               | Eua                 | Cl             | <i>Trifolium pratense</i>         | +1         | 1,5 | +3  | ++  | +2  | +3         | 1,5        | V   |
| H               | Eua                 | Cl             | <i>Ranunculus acer</i>            | +2         | —   | —   | ++  | ++  | ++         | +3         | IV  |
| H               | Cosm                | Cl             | <i>Prunella vulgaris</i>          | +3         | ++  | ++  | +3  | —   | ++         | ++         | V   |
| H               | Eua                 | Cl             | <i>Vicia cracca</i>               | —          | ++  | —   | ++  | —   | +2         | —          | III |
| H               | Eua                 | Cl             | <i>Leontodon hispidus</i>         | +5         | —   | —   | —   | —   | —          | —          | I   |
| H               | Cp                  | Cl             | <i>Poa pratensis</i>              | ++         | —   | ++  | ++  | —   | —          | —          | III |
| H               | Eua                 | Cl             | <i>Plantago lanceolata</i>        | ++         | —   | —   | ++  | —   | —          | —          | II  |
| H               | Eua                 | Cl             | <i>Briza media</i>                | —          | +4  | ++  | —   | —   | —          | —          | II  |
| H               | Eua                 | Cl             | <i>Poa trivialis</i>              | —          | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |
| Th              | E                   | Cl             | <i>Euphrasia rostkoviana</i>      | —          | —   | —   | ++  | —   | —          | —          | I   |
| H               | Ec                  | In             | <i>Centaurea austriaca</i>        | +2         | +2  | ++  | +2  | —   | —          | +2         | IV  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Plantago media</i>             | +2         | —   | ++  | +4  | ++  | —          | +2         | IV  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Cichorium intybus</i>          | ++         | —   | ++  | ++  | ++  | —          | +1         | IV  |
| Ch              | Ec                  | In             | <i>Thymus pulegioides</i>         | +4         | +3  | ++  | ++  | —   | —          | —          | III |
| H               | Eua                 | In             | <i>Galium verum</i>               | +3         | ++  | ++  | —   | —   | —          | —          | III |
| H               | E                   | In             | <i>Polygala vulgaris</i>          | +3         | +1  | +1  | —   | —   | —          | —          | III |
| G               | E                   | In             | <i>Colchicum autumnale</i>        | +1         | +1  | +2  | —   | —   | —          | —          | III |
| H               | Eua                 | In             | <i>Pimpinella saxifraga</i>       | ++         | —   | —   | ++  | ++  | —          | —          | III |
| H               | Eua                 | In             | <i>Medicago falcata</i>           | +1         | +5  | ++  | ++  | —   | —          | —          | III |



Tabelul nr. 3 (continuare)

| Forma biologică | Elementul floristic | Caracteristica | Numărul releveului             | 1          | 2   | 3   | 4   | 5   | 6          | 7          | K   |  |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|-----|--|
|                 |                     |                | Mărimea releveului (m²)        | 100        | 25  | 25  | 25  | 25  | 25         | 25         |     |  |
|                 |                     |                | Altitudinea (m)                | 600        | 600 | 600 | 560 | 560 | 620        | 760        |     |  |
|                 |                     |                | Expoziția                      | plan       |     |     |     |     |            |            |     |  |
|                 |                     |                | Înclinația (grade)             | —          | —   | —   | —   | —   | —          | —          |     |  |
|                 |                     |                | Acoperirea vegetației (%)      | 90—<br>100 | 95  | 100 | 100 | 100 | 90—<br>100 | 90—<br>100 |     |  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Trifolium repens</i>        | —          | +1  | —   | +3  | +2  | —          | +1         | III |  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Leontodon autumnalis</i>    | —          | —   | —   | +1  | ++  | +5         | ++         | III |  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Campanula glomerata</i>     | —          | —   | —   | ++  | +3  | —          | ++         | III |  |
| H               | C                   | In             | <i>Festuca sulcata</i>         | +1         | —   | +2  | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Hypericum maculatum</i>     | ++         | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Cirsium oleraceum</i>       | ++         | —   | —   | —   | —   | ++         | —          | I   |  |
| H               | Ec                  | In             | <i>Carlina acaulis</i>         | ++         | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | E                   | In             | <i>Campanula rapunculoides</i> | ++         | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Ranunculus polyanthemos</i> | —          | +2  | ++  | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| G               | Cosm                | In             | <i>Equisetum arvense</i>       | —          | +2  | —   | —   | —   | +3         | —          | I   |  |
| H               | Ec                  | In             | <i>Salvia verticillata</i>     | —          | ++  | —   | ++  | —   | —          | —          | I   |  |
| TH—H            | Eua                 | In             | <i>Melandrium album</i>        | —          | —   | —   | +1  | ++  | —          | —          | I   |  |
| TH—H            | C                   | In             | <i>Bunias orientalis</i>       | —          | —   | —   | +1  | —   | —          | ++         | I   |  |
| TH              | Eua                 | In             | <i>Echium vulgare</i>          | —          | —   | —   | ++  | ++  | —          | —          | I   |  |
| Th              | E                   | In             | <i>Linum catharticum</i>       | ++         | —   | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | Ec                  | In             | <i>Dianthus carthusianorum</i> | +1         | —   | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | E                   | In             | <i>Hypochoeris radicata</i>    | ++         | —   | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | Ec                  | In             | <i>Cirsium erisithales</i>     | —          | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | End                 | In             | <i>Silene dubia</i>            | ++         | —   | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | Ec                  | In             | <i>Senecio umbrosus</i>        | —          | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Carex distans</i>           | —          | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | E                   | In             | <i>Festuca heterophylla</i>    | —          | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | C                   | In             | <i>Hieracium cf. bauhini</i>   | —          | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| G               | Eua                 | In             | <i>Listera ovata</i>           | —          | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | Alp                 | In             | <i>Myosotis alpestris</i>      | —          | +1  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H-G             | Mp                  | In             | <i>Ranunculus stevenii</i>     | —          | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| Ch              | E                   | In             | <i>Anthriscus vulneraria</i>   | —          | ++  | —   | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | M                   | In             | <i>Onobrychis viciifolia</i>   | —          | —   | +3  | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| Th              | E                   | In             | <i>Bromus commutatus</i>       | —          | —   | ++  | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | C                   | In             | <i>Trifolium montanum</i>      | —          | —   | ++  | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Salvia nemorosa</i>         | —          | —   | ++  | —   | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | Ec                  | In             | <i>Primula officinalis</i>     | —          | —   | —   | +2  | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Filipendula hexapetala</i>  | —          | —   | —   | +3  | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | E                   | In             | <i>Betonica officinalis</i>    | —          | —   | —   | ++  | —   | —          | —          | I   |  |
| H               | E                   | In             | <i>Belis perennis</i>          | —          | —   | —   | —   | +1  | —          | —          | I   |  |
| H               | Cosm                | In             | <i>Lythrum salicaria</i>       | —          | —   | —   | —   | —   | +1         | —          | I   |  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Filipendula ulmaria</i>     | —          | —   | —   | —   | —   | +1         | —          | I   |  |
| H               | E                   | In             | <i>Symphytum officinale</i>    | —          | —   | —   | —   | —   | +1         | —          | I   |  |
| H               | E                   | In             | <i>Ranunculus repens</i>       | —          | —   | —   | —   | —   | +3         | —          | I   |  |
| H               | Eua                 | In             | <i>Vicia sepium</i>            | —          | —   | —   | —   | —   | —          | ++         | I   |  |
| H               | Alp                 | In             | <i>Alchemilla hybrida</i>      | —          | —   | —   | —   | —   | —          | ++         | I   |  |

Localizarea releveelor: R<sub>1,2,3</sub>, malul râului Bicaz la Bicazu Ardelean; R<sub>4,5</sub>, lunca Bistricioarei la Poiana Grințieșului; R<sub>6</sub>, Gura Pintecului; R<sub>7</sub>, pârâul Suricu.

tim: *Trifolium pratense*, *Medicago lupulina*, *Festuca pratensis*, *Lotus corniculatus*, *Taraxacum officinale*, *Leontodon hispidus* ș.a.

Menționăm de asemenea prezența în structura floristică a unor specii medicinale, ca *Achillea millefolium*, *Trifolium pratense*, *Colchicum autumnale*, *Pimpinella saxifraga*, *Cichorium intybus*, *Taraxacum officinale*, *Equisetum arvense*, *Lythrum salicaria*, *Symphytum officinale* ș.a., precum și a unor specii melifere, ca *Bunias orientalis*, *Salvia nemorosa*, *Trifolium repens*, *Salvia verticillata*, *Cichorium intybus* ș.a.

Speciile toxice și cu valoare furajeră slabă sînt foarte puține la număr, și anume *Equisetum arvense*, *Ranunculus repens*, *Colchicum autumnale*, *Ranunculus acer*.

*Succesiunea. Trisetum flavescens* ia naștere din aceleași formațiuni ca și *Arrhenatheretum elatioris*, dar se poate dezvolta și direct din *A. elatioris* ca urmare a înrăutățirii condițiilor de umiditate și troficitate din sol. În cadrul succesiunii normale, *Trisetum flavescens* este urmată de asociații din alianța *Agrostidetum* — *Festucion rubrae*: *Agrostetum tenuis* sau *Festucetum rubrae montanum*.

## BIBLIOGRAFIE

- BORHIDI A., Acta bot. Acad. Sci. Hung., 1958, IV, 3—4.
- BORZA AL., Flora și vegetația văii Sebeșului, Edit. Acad. R.P.R., București, 1959.
- BORZA AL., Contribuții botanice, Cluj, 1966, II.
- BOȘCAIU N. și colab., Contribuții botanice, Cluj, 1966, I.
- BURDUJA C., Ocrotirea naturii, 1962, 6.
- CSÜRÖS ȘT., Acta Bolyaiana, Cluj, 1947.
- CSÜRÖS ȘT., POP I., HODIȘAN I. și CSÜRÖS-KAPTALAN M., Contribuții botanice, Cluj, 1968.
- GERGELY I., Contribuții botanice, Cluj, 1964.
- GRINȚESCU I., Bul. Soc. št. Cluj, 1924, II, 2.
- Guide de la VI<sup>e</sup> Excurs. Phytogéogr. Intern. Roumanie, Cluj, 1931.
- HODIȘAN I., Contribuții botanice, Cluj, 1968.
- KOVÁCS A. și COLDEA GH., Contribuții botanice, Cluj, 1967.
- NYÁRÁDY E. I., Bul. Grăd. bot. Cluj, 1924, IV, 2—3.
- PAUCĂ A., PUȘCARU-SOROCEANU E. și CIUCĂ M., Comunicări de botanică, 1960.
- POP I., HODIȘAN I., RAȚIU O. și PĂLL ȘT., Contribuții botanice, Cluj, 1960.
- PUȘCARU-SOROCEANU E. și colab., Pășunile și fânețele din R.P.R., Edit. Acad. R.P.R., București, 1963.
- RACLARU P., Comunicări de botanică, 1967.
- RAȚIU O., Contribuții botanice, Cluj, 1964.
- RESMERIȚĂ I., St. și cerc. agron. Acad. R.P.R., Cluj, 1958, IX.
- SAFTA I., Anal. Inst. cerc. agron. Rom., 1936, VIII.

Institutul agronomic „Ion Ionescu de la Brad”  
Iași.

Primit în redacție la 28 ianuarie 1971.

## LUCRĂRILE CONSFĂTURII SPECIALIȘTILOR DIN ȚĂRILE SOCIALISTE ÎN PROBLEMA CULTURII ÎN MASĂ A ALGELOR

La sfârșitul lunii noiembrie 1970 a avut loc la Leningrad o consfătuire științifică privind „Studiul fiziologiei culturii algelor cu coeficient ridicat de folosire a luminii”.

La această manifestare științifică au participat oameni de știință din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, România, U.R.S.S. și Ungaria. Au fost prezentate un număr mare de lucrări științifice privind cele mai variate aspecte ale culturii algelor, desprinzându-se concluzia că în decursul anului 1970 în toate țările participante a crescut nivelul cercetărilor de bază atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Ridicarea nivelului lucrărilor se exprimă prin rezolvarea a numeroase și importante probleme fundamentale de biologie generală, precum și prin folosirea celor mai moderne metode de cercetare.

În cursul anului 1970 rezultate importante s-au obținut privind studiul specificității și metabolismului acizilor nucleici, lipidelor, steroizilor, substanțelor aromatice și compușilor fiziologic activi la alge. În atenția cercetătorilor au fost problemele legate de mecanismele și intensificarea fotosintezei algelor unicelulare. S-a studiat interdependența dintre conținutul ADN și pigmenții activi ai fotosintezei în celulele de *Scenedesmus* care poate fi folosită drept criteriu al creșterii și al aprecierii schimbării ciclului celulelor la diferite specii de alge. S-au obținut noi date în domeniul nutriției minerale și heterotrofe a algelor, al schimbului de substanțe în dependență de forma de azot existentă în mediul nutritiv.

Cercetările de microscopie electronică au început să fie folosite pentru studierea particularităților metabolismului, influenței factorilor extremali, a efectelor de adaptare și readaptare.

Au fost luate în studiu probleme legate de filogenie și taxonomie a algelor inferioare; amintim că în această direcție prezintă un interes deosebit ultrastructura pereților celulari la diferite specii de alge.

În toate țările participante s-a continuat acțiunea de izolare din natură a noi specii de alge cu scopul introducerii celor de perspectivă în culturi de laborator sau în masă sub cerul liber; de asemenea s-au făcut primele aprecieri asupra sușelor din colecții.

O atenție deosebită s-a acordat problemei contaminării culturii algelor cu ciuperci, bacterii și virusuri și s-au schițat câteva căi de combatere a bolilor infecțioase la algele inferioare.

S-au aprofundat cercetările din domeniul geneticii și selecției algelor, acordându-se atenție mutațiilor. S-a stabilit însemnătatea eficacității acțiunii metil-N-nitrozouretanului asupra măririi diversității genetice la algele unicelulare.

Pentru prima dată alga *Spirulina platensis*, care pare să fie o specie de perspectivă, a început să fie cultivată în U.R.S.S., în scopuri semiindustriale, în masă sub cerul liber. S-au întreprins cercetări comparative asupra productivității algelor protococale și a altor specii în bazine sub cerul liber și rezervoare închise.

În domeniul culturii în masă a algelor sub cerul liber, s-a amintit și de colaborarea dintre Bulgaria și Cehoslovacia care au folosit în acest scop apa unor izvoare naturale bogate în  $\text{CO}_2$  din sudul Bulgariei.

De asemenea au fost prezentate date importante privind posibilitatea ridicării biomasei algelor pe unitatea de suprafață iluminată, prin folosirea intensă a luminii solare.

Într-o serie de instituții din țările participante la consfătuire s-au întreprins cercetări de hrănirea animalelor cu biomasa algelor, în vederea înlocuirii proteinei de origine animală, constatându-se că adaosul de alge în hrana păsărilor mărește cantitatea de carotinoizi din ouă și carne și ridică calitatea cărnii. S-a mai studiat și eficacitatea adaosului de alge în hrana peștilor, precum și a bovinelor și suinelor în special în zonele climatice calde din U.R.S.S.

Un deosebit interes prezintă cercetările privind cultura combinată a algelor cu bacterii pe medii care conțin petrol, în vederea biosintezei substanțelor proteice.

De asemenea s-au întreprins cercetări în direcția purificării biologice cu ajutorul algelor a apelor de scurgere provenite din industrie.

M. Paraschiv

## RECENZII

BOHUSLAV FOTT, *Algenkunde (Algologie)*, VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1971, ed. a 2-a, 581 p.

Cartea este o monografie cuprinzând 4 capitole, intitulate: 1. Algele în sistemul vegetal natural; 2. Taxonomia diferitelor tulpini de alge; 3. Ecologia și incidența în natură; 4. Importanța algelor pentru om. În afara acestor 4 capitole, cartea mai cuprinde și un registru de autori, de nume și de subiecte. Fiecare capitol este urmat de bibliografia citată în cuprinsul său.

Deși nu se poate vorbi de alge fosile, algele care există în prezent în natură au permis autorului reconstituirea evoluției lor în linii mari și crearea bazelor unui sistem filogenetic. În ceea ce privește partea de ecologie, ea tratează condițiile mediului extern, care au permis algelor să se constituie în asociații caracteristice și să devină un component predominant al unei biocenozes. Deoarece algele se găsesc în cantități mari, ele pot fi folosite de către om ca materie primă sau pot deveni nocive. Foloasele sau pagubele pe care algele le pot pricinui omului sunt tratate în ultimul capitol al cărții în cadrul următoarelor subcapitole: 1. Importanța algelor pentru pești și heleștele; 2. Nocivitatea algelor; 3. Importanța algelor pentru calitățile tehnologice și puritatea apei; 4. Algele în agricultură; 5. Algele în medicină.

Indicațiile bibliografice expuse la sfârșitul fiecărui capitol cuprind principalele manuale și tratate citate în text. Nu sunt citați toți autorii găsiți în alte manuale, sunt însă menționate sursele de literatură în care se poate găsi o bibliografie bogată.

Cartea răspunde unei necesități a studiului criptogamelor la nivelul învățământului superior. Caracterul aprofundat al conținutului său și complexitatea problemelor abordate o fac însă să servească nu numai ca un curs pentru învățământul superior, ci ca sursă de informație pentru omul de știință, alături de practică cit și în cercetare.

În ultimii 10 ani cercetarea algologică a dus la atâtea descoperiri, încât numai anumite părți ale acestei științe au necesitat o prelucrare totală, altele fiind doar completate. În introducerea cărții autorul arată că versiunea germană nu corespunde întocmai celei cehe, cuprinzând în plus față de aceasta noile cunoștințe și descoperiri și un număr de ilustrații considerabil mărit.

Ilustrațiile au fost astfel alese, încât să reprezinte tipuri importante și caracteristice și care au o importanță mare pentru producția biologică a apelor. Acolo unde autorul nu a dispus de ilustrații proprii, a recurs la ilustrații din literatura clasică și modernă. Multe figuri însă sunt desene originale executate de specialiști, anume pentru această lucrare.

Cartea este editată în condiții grafice excepționale și reprezintă o lucrare indispensabilă tuturor celor care se ocupă cu studiul algelor.

Margareta Dumitrescu

\*\*\* *Fiziologo-biohimeskie osnovy vzaimodeistviia rastenii v fitocenozakh (Bazele fiziologo-biochimice ale interacțiunilor dintre plante în fitocenoză)*, sub red. A. M. GRODZINSKII, Kiev, 1970, 324 p.

Apariția acestui volum, cuprinzând lucrările prezentate la Simpozionul Unional care a avut loc la Kiev în 1967 cu privire la explicarea bazelor fiziologo-biochimice ale interacțiunilor fitocenotice, reprezintă o valoroasă contribuție colectivă la precizarea rolului proceselor aleopatice în viața plantelor și dinamica alcătuirii comunităților de plante. Cele 53 de contribuții, care alcătuiesc conținutul acestui volum, subliniază interesul tot mai mare pe care-l prezintă acest vast domeniu de cercetare.

În partea I a volumului, consacrată problemelor generale ale alelopaticii, se relevă interesul lucrărilor lui A. M. Grodzinskii privitoare la bazele fiziologice și biochimice ale proceselor care se desfășoară în cadrul asociațiilor vegetale, ale lui M. V. Markov asupra fitocenozelor ca modalități de coexistență a organismelor vegetale, precum și ale lui V. V. Polevoi asupra căilor posibile ale influențelor aleopatice în sistemul de reglare a creșterii plantelor. În aceeași parte a volumului, C. H. Müller prezintă rezultatele cercetărilor întreprinse în această direcție în California, V. S. Porfiriev arată noile orientări ale cercetărilor aleopatice în fitocenologie, iar S. I. Cernobrivenko și V. I. Shanda semnează un interesant studiu asupra unor aspecte agroecotice realizate prin mecanisme aleopatice.

În partea a II-a volumul cuprinde 21 de lucrări privitoare la interacțiunile plantelor din agroecotice. Din acest număr mare de contribuții valoroase, relevăm lucrarea lui G. Grümmer, în care se demonstrează efectul autoinhibitor al reziduurilor rămase pe câmp după recoltarea înului și al cărui compuși chimici se păstrează îndelungat în stare adsorbită în sol, precum și lucrarea lui O. A. Beresteckii privind rolul produșilor de descompunere a resturilor de rădăcini care determină toxicitatea solului de grădină. Problemele referitoare la interacțiunile dintre plantele de cultură în însămânțările în amestec sunt tratate în lucrările lui Z. Lastuvka, I. Mnarz, I. A. Kaurov, E. G. Tomașevskaia, E. Lugovskaia, E. I. Guliaev, V. K. Nosko și G. A. Ronsal.

Partea a III-a a volumului cuprinde 9 lucrări privitoare la efectele mutuale ale plantelor ce conviețuiesc în cenozele naturale. Pentru dirijarea potențialului productiv al pajiștilor naturale prezintă un interes major lucrarea lui H. O. Kimmel și K. M. Pork, în care se explică unele modificări intervenite în compoziția speciilor din pășuni prin efectul integral al proceselor aleopatice. De asemenea L. V. Gavrilova prezintă efectul inhibitor al unor extracte apoase din mușchi și licheni asupra germinării semințelor de pin și brad, precum și efectul considerabil stimulator asupra semințelor de larice.

În partea a IV-a a volumului sunt cuprinse 8 lucrări referitoare la procesele microbiologice din fitocenoză care se găsesc într-o strinsă corelație cu cele aleopatice. Se arată astfel interacțiunea dintre produșii metabolici ai microflorei și excrețiile radiculare în procesul absorbției radiculare (P. A. Vasiuk, A. B. Manorik, N. I. Belima și M. M. Nicik), precum și efectul antimicrobian al unor substanțe elaborate de plantele superioare (L. P. Scerbanovskii și G. I. Nilov).

În partea a V-a sunt inserate 5 lucrări în care sunt prezentate aspecte ale interacțiunilor dintre plante în comunitățile acvatice.

Ultima parte a volumului cuprinde 4 lucrări privitoare la metodică cercetărilor aleopatice, reînviind-ne interesul comunicarea lui R. Kickuth asupra unui dispozitiv experimental aeroponic pentru studiul efectelor aleopatice și al substanțelor ecologic active.

Volumul se încheie cu un necrolog închinat memoriei lui Serghei Ivanovici Cernobrivenko (1899–1967), unul dintre principalii inițiatori ai studiilor asupra alelopaticii în U.R.S.S.

Bibliografia însumează 520 de titluri, din care 328 sînt în limba rusă.

Pe lângă importanța pentru preocupările agrotehnice, lucrările cuprinse în acest volum prezintă un interes deosebit pentru fitocenologia experimentală, oferind prețioase puncte de sprijin pentru o interpretare cauzală a dinamicii comunităților de plante.

Alexandru Borza și Eugenia Chircă

Revista „Studii și cercetări de biologie — Seria botanică” publică articole originale din toate domeniile biologiei vegetale : morfologie, sistematică, geobotanică, ecologie și fiziologie, genetică, microbiologie — fitopatologie. Sumarele revistei sînt completate cu alte rubrici, ca : 1. *Viața științifică*, ce cuprinde unele manifestări științifice din domeniul biologiei vegetale, ca simpozioane, consfătuiri, schimburi de experiență între cercetătorii români și cei străini etc. 2. *Recenzii* ale unor lucrări de specialitate apărute în țară și peste hotare.

#### NOTĂ CĂTRE AUTORI

Autorii sînt rugați să înainteze articolele, notele și recenziile dactilografiate la două rînduri. Tabelele vor fi dactilografiate pe pagini separate, iar diagramele vor fi executate în tuș, pe hîrtie de calc. Tabelele și ilustrațiile vor fi numerotate cu cifre arabe. Figurile din planșe vor fi numerotate în continuarea celor din text. Se va evita repetarea aceluiași date în text, tabele și grafice. Explicația figurilor va fi dactilografiată pe pagină separată. Citarea bibliografiei în text se va face în ordinea numerelor. Numele autorilor va fi precedat de inițială. Titlurile revistelor citate în bibliografie vor fi prescurtate conform uzanțelor internaționale.

Autorii au dreptul la un număr de 50 de extrase, gratuit.

Responsabilitatea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor.

Corespondența privind manuscrisele, schimbul de publicații etc. se va trimite pe adresa Comitetului de redacție, Splaiul Independenței nr. 236, București.

La revue « Studii și cercetări de biologie — Seria botanică » paraît 6 fois par an.

Toute commande à l'étranger sera adressée à I.C.E. LIBRI, Boîte postale 134—135 (Calea Victoriei 126), Bucarest, Roumanie, ou à ses représentants à l'étranger.

En Roumanie, vous pourrez vous abonner par les bureaux de poste ou chez votre facteur.